

является одним из основных элементов мирмекофауны пояса еловых лесов в центральном Тянь-Шане.

Самка сильно напоминает ♂, но размеры тела более крупные (длина тела 5,4 — 6,0 мм). Заднеспинка с длинными острыми шипами (см. рис. 9). Метастернальные зубчики хорошо выражены. Рукоять усиков на сгибе с очень слабым зубчиком. Членики стебелька очень морщинистые, со слабым блеском. Первый снизу с тупым зубцом, сверху угловатый. Голова и грудь с густой поверхностной скульптурой, матовые; брюшко гладкое и блестящее.

Самец. Длина тела 5 — 5,4 мм. Голова округлая со слабым блеском. Глаза довольно крупные и сильно выпуклые. Булава усиков почти 5-члениковая. Заднеспинка с притупленными зубчиками. Первый членик стебелька сверху равномерно закругленный. Гладкий и блестящий, только при помощи микроскопа можно обнаружить немногочисленные косые морщинки по бокам. Весь черный, только сочленения ног и усики более светлые. Отстоящие волоски на теле как у *M. scabrinodis lobicornis*. Кроме того на ногах крайне тонкое, беловатое, полуприлегающее опушение.

*M. scabrinodis intermedia*, sbsp. nov. — Epinotumdornen lang, scharf zugespitzt, etwas nach unten gebogen, mehr nach hinten, als nach oben gerichtet. Mesoepinotaleinsenkung scharf und ziemlich tief. Metasternalzähnnchen eckig, abgestumpft. Erstes Petiolusglied wie bei *M. scabrinodis lobicornis* ziemlich kurz. Fühlerschaft an der geknickten Stelle dornartig vorgezogen. Körperfärbung hellgelb, etwas rötlich, Stirn bräunlich; Abdomen oben schwärzlich-braun. Bisweilen der Grundton ist dunkler, bräunlich-rot. Körperlänge 3,6 — 4,5 mm.

Окрестности Копала, под камнем (найдена только одна колония П. П. Архангельским).

*M. scabrinodis scabrinodis* Nyl. — Шахимардан: Гульча (Maug, 1877). Таласский Алатау (Рузский, 1905). Ирке-кашка на р. Араван (Караваев, 1916). Алма-ата; урочище Долоното на сев. берегу Иссык-куля; от Тополевки до Лепсинска; Царицынский поселок; Джуука на южн. берегу Иссык-куля; Скобелев; Каракол; Аулие-ата; Бизил-тал в зап. отрогах Таласского Алатау, верховья р. Угам.

Мои экземпляры сходны с экземплярами из окрестностей Москвы (полученными от В. В. Алпатова), но тождественны ли последние с западноевропейскими, я не знаю. Исследование серий из одного места показывает значительную амплитуду индивидуальной изменчивости, вследствие чего я не выделяю особых форм, хотя, напр., экземпляры из Аулие-ата и Бизил-тала заметно отличаются от семиреченских, более сходных с экземплярами из Москвы. Окраска довольно разнообразна: одни особи монотонны, будучи окрашены в красновато-коричневый цвет, другие при более светлом основном тоне обладают очень темным, почти черным брюшком. Самки окрашены светлее рабочих, отличаются кроме того короткими и очень широкими при основании шипиками. Экземпляры из Скобелева