

вообще не типичны: окраска рабочих и самок более темная, красновато-коричневая с более темными верхом груди, брюшка и головы. Длина тела самки еле достигает 5,4 мм (у экз. из Семиречья 5,5—6 мм). В общем наблюдается некоторое сходство с *M. scabrinodis angulinodis*, от которой они отличаются сильно развитой передней цилиндрической частью первого членика стебелька и более темной окраской.

*M. scabrinodis rugulosa* Nyl. — Ягноб (2 экз.; Мауг, 1877). Нахождение этого подвида в Туркестане нуждается в подтверждении.

*M. scabrinodis lobicornis* Nyl. — На плоскогории Алай; площадка Лянгар (Мауг, 1877). Шугнан, р. Гунт; Шах-дара; Хорог (Fogel, 1903; это местонахождение пропущено Русским в его монографии «Муравьи России»). Таласский Алатау; в степи около Аулие-ата и в культурной полосе около арыков и в садах (Русский, 1905). Мне эта форма в Средней Азии ни разу не встречалась.

Крупные рабочие этого подвида собраны И. А. Райковой около Гульчи. Величина тела их достигает почти 6 (5,7) мм. Шипы заднеспинки короче ее основной поверхности, но цилиндрическая часть первого членика стебелька не так коротка, как указывает Emery (Fauna Entomologica Italiana, Formicidae, 1916); кроме того сверху этот членик с сильно закругленным углом, тогда как у западноевропейских особей он в профиль остроугольный. Кроме того, Emery приводит для Западной Европы меньшие размеры (3,5—5,0 мм). В виду этого я считаю возможным выделить эти экземпляры в особую форму: *M. scabrinodis lobicornis grandis*, var. nov. — Grösser als die typische *M. lobicornis*, Körperlänge erreicht fast 6 (5,7) mm. Epinotumdornen kürzer als seine Horizontalfäche. Die vordere zylindrische Hälfte des ersteren Petiolusgliedes länger, als bei typischen europäischen *M. scabrinodis lobicornis*. Erstes Petiolusglied oben breit abgerundet, nicht spitzeckig, wie bei west-europäischen Exemplaren.

---

Объяснения рис. 1 — 23.

1. *Acanthomyops carniolicus* Мауг, усики; Дуаны-тау. — 2. *A. niger nitidus*, nov., профиль груди; Бахмаль-куль. — 3. То же, усики. — 4. *A. emeryi* Рус., усики; Мин-булак. — 5. *A. alienus flavidus*, nov., профиль груди; Дуаны-тау. — 6. То же, челюстное шупальце; Дуаны-тау. — 7. *A. alienus turkmenus*, nov., усики; Геок-тепе. — 8. *A. alienus pilicornis*, nov., усики; Дженйшке. — 9. *Myrmica ruginosa dshungarica* Рус., стебелек, ♀ верх. р. Ассы. — 10. То же, ♂. — 11. То же. — 12. То же, совокушительный аппарат ♂. — 13. То же, усик ♂. — 14. То же, ♀. — 15. То же, в профиль; Алмаатинское озеро. — 16. То же, крыло; Джалауаш. — 17. *M. scabrinodis zaroshnikovi* Рус., стебелек ♂. Барскоун. — 18. То же, ♀. — 19. То же, усик ♂. — 20. То же, крыло, Джалауаш. — 21. То же, изменчивость шипов заднеспинки ♀; Джитыгуз. — 22. *M. ruginosa dshungarica* Рус., изменчивость шипов заднеспинки ♀; Джаргылчак. — 23. *M. scabrinodis scabrinodis* Nyl., стебелек ♀; Аулие-ата.