

27. *Formica sanguinea clarior* RUZ. — Atli-Bujun-Kette; Bujnask; Lewaschi bis Gunib (RUZSKY, S. 416). (Mit der typischen *F. sanguinea* LATR.)

28. *Proformica nasuta* NYL. — Lewaschi; Chodshal-Macha; Atli-Bujun-Kette; Derbent; Gunib (RUZSKY, S. 425); Gunib, Steppe.

Areal: Südrußland (Saratov, Odessa, Astrachan, Guberlinisches Gebirge, Nordosten von Orenburg); Krim; Kaukasus (weit verbreitet); Mittelasien; westliches Sibirien.

29. *Cataglyphis bicolor desertorum* FOREL (= *Myrmecocystus viaticus* var. *desertorum* FOR.). — Tal des Rubasflusses; Derbent. Der letztere Punkt ist der nördlichste Fundort dieser Form.




Abb. 2. Geographische Verbreitung von *Cataglyphis bicolor, desertorum* im westlichen Transkaukasus.

Areal: Mittelmeergebiet (der südliche, afrikanische Teil); Abessinien; Mesopotamien; Westpersien; südliches Turkmenistan, westlich vom Amu-Darja-Fluß (selten). Im Kaukasus nur im östlichen Transkaukasien, nach Westen bis Tiflis und längs des Kaspischen Meeres, nach Norden bis Derbent.

Station: Offenes Gelände, hauptsächlich die Wüsten oder Halbwüsten.

30. *Cataglyphis pallidus* MAYR. — Umgegend von Machatsch-Kala, Sanddünen auf dem Strande des Kaspischen Meeres.

Areal: Kleinasien; Arabien; Syrien; Pälstina; Persien; westliche Hälfte der turanischen Niederungen; Kirgisensteppen westlich bis zu dem Wolgaunterlauf.