

48. *Pheidole pallidula* NYL. — Umgegend von Machatsch-Kala; Atli-Bujun-Kette; Steppe auf dem Wege nach Bujnaksch (RUZSKY, S. 646)

Areal: Mittelmeergebiet; Iran; Turan. Sehr gemein im östlichen Transkaukasien und in Mittelasien. Geht nach Norden bis zum Indergebirge, nördlich vom Kaspischen Meer. Im Gebirge steigt die Art bis 600 (Kaukasus), 8000 (Mittelasien) Fuß auf.

Station: Wüsten und steinige Steppen.

49. *Myrmica rubida* LATR. — Gunib; Karabachischer Wald (RUZSKY, S. 657).

Montane Art. Im Kaukasus (nach RUZSKY) lebt sie in der oberen Zone der Birken- und Kiefernwälder, dann überall auf




Abb. 4. Geographische Verbreitung von *Myrmica bergi* Ruz.

alpinen Wiesen, bis zu der unteren Grenze der Gletscher verbreitet. Aber ich habe diese Art viel niedriger, in der Schlucht von Darjal, gefunden, wo sie auf den offenen Abhängen unter Steinen nistet.

Areal: Mittel- und Südeuropa; Kleinasien; Kaukasus.

50. *Myrmica laevinodis ruginodis* NYL. — Gunib und Karabachischer Wald (RUZSKY, S. 674).; Kubitschi (KARAWAJEW, S. 94).

51. *Myrmica bergi* Ruz. — Tuschilovka.

Diese Art wird zum erstenmal vom Aralsee beschrieben, später auch in einigen anderen Orten der Ebenen Turkestans und in den Kirgisensteppen bis zum Unterlauf der Wolga entdeckt. Bisher ist sie nicht in Turkmenistan (westlich von Amu-Darja) und im östlichen Transkaukasien nachgewiesen.

Lebt auch in Mesopotamien (CRAWLEY, *Ants from Mesopotamia and North-West Persia. The Entom. Rec.*, 1920, XXXII, p. 162—166, 177—179).