

According to Emery (1925) *gagatoides* has been found in Thibet too, but this occurrence has been dropped by Stitz (1939).

Distribution in Norway:

- Southern Norway: On, Hjerkinn, Dovre (1853, Siebke)
 » Dovre, (1843, Siebke)
 » Dovre (Munster)
 » Vålåsjø, Dovre (1938, A. Strand)
 » Storholiseter (Munster)
- Bv, Ustaoset (1940, Y. Hagen)
- Ri, Jonstøl, Suldal (2 colonies, 1940,
 Holgersen)
 » Bleskestadmoen, Suldal (some 10 col.,
 1940—42, Holgersen)
- STi, Kongsvoll, Dovre (Lindman acc. to
 Adlerz)
- Northern Norway: Nsi, Grønlidalen, Rana (1931, Fr. Jensen)
 TRi, Målselv (1916, Natvig)
 » Nordmo, Målselv, (1906
 Sparre Schneider)
 » Tabmokdal, Balsfj. (1922, Soot-Ryen)
- TRy, Tromsø (Sparre Schneider)
 » Ramfjord (1924, Soot-Ryen)
- Fv, Hammerfest, (Munster)
- Fi, Alta, (1924, A. Strand)
 » Vina, Alta (1924, A. Strand)
- Fn, Kolvik (1908, Sparre Schneider)
 » Lakselv, Porsanger (1907—08,
 Sparre Schneider)
 » Stabburselv (1931, Fr. Jensen)
 » Børselv (W. M. Schøyen)
 » Skoganvarre (1931, Fr. Jensen)

I have seen specimens from all these Norwegian localities except from Kongsvoll.