

ESPECIES CONOCIDAS POR LA OBRERA Y EL MACHO

ECITON (ACAMATUS) STROBELLI (Mayr) 1868

(Figs. 19 y 20)

Labidus Strobeli. MAYR, *Ann. Soc. Nat. Modena*, t. III, p. 166 ♂, 1868.

Eciton Strobeli. BERG, *An. Soc. Cient. Arg.*, t. XXIV, p. 18, ♂, 1890.

DALLA TORRE, *Cat.* VII, p. 6 ♂, 1893.

Eciton (Acamatus) Strobeli. EMERY, *Mem., Accad. Sc. Bologna*, (5) t. VIII, p. 515, fig. 12 ♂, 1900; *Bull. Soc. Entomol. Ital.*, t. XXXVII, p. 3 ♂, 1905.

FOREL, *Ann. Soc. Entomol. Belgique*, t. LVI, p. 45 ♂, 1912; *Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat.*, t. XLIX, p. 209 ♂, 1913.

EMERY, *Doryl Gen. Insect.*, p. 209 ♂, 1910.

Eciton (Labidus) Strobeli. BRUCH, *Cat.*, p. 215 ♂, 1914.

Eciton nitens. MAYR, *Ann. Soc. Nat. Modena*, t. III, pág. 168, ♀, 1868.

MAYR, (part.) *Wien. Ent. Zeitschr.*, t. V, p. 121 ♀, 1886.

BERG, *An. Soc. Cient. Arg.*, t. XXXIX, p. 18 ♀, 1890.

DALLA TORRE, *Cat.* VII, p. 5 ♀, 1893.

Eciton (Acamatus) nitens. EMERY, *Mem. Accad. Sc. Bologna* (5), t. VIII ♀, p. 515, 1900; *Bull. Soc. Entomol. Ital.*, t. XXXVII ♀, p. 109, 1905; *Doryl. Gen. Insect.*, p. 24 ♀, 1910.

FOREL, *Mém. Soc. Entomol. Belgique*, t. XX, p. 31 ♀, 1912; *Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat.*, t. XLIX, p. 209 ♀, 1913.

BRUCH, *Cat.* p. 215 ♀, 1914.

Eciton (Acamatus) Strobeli. BRUCH, *Rev. Mus. Plata*, t. XXIII, (2.^a ser., t. X), p. 294-5 ♀ ♂, 1916.

SANTSCHI *Physis*, t. II, N.^o 12, p. 370 ♀ ♂, 1916.

Esta es sin duda la especie del subgénero *Acamatus* más abundante en el país y la de más vasta distribución geográfica.

Ha sido también, con *sulcatum*, la más antiguamente descripta en dos de sus castas, obreras y machos, aunque bajo nombres diferentes por Mayr, en su trabajo acerca de la colección de Strobel (1868), base de la mirmecología argentina.

Doy en seguida la descripción original de Mayr, (*Ann. Soc. Nat. Modena*, III. 1868 p. 10) y su traducción española.

«*Eciton nitens*. (Fig. 19).

Operaria. Long. 2,8-6,5 mm. Rufa, nitida, mandibulis genisque antice obscure castaneis; mandibulae fortiter striatae, margine mas-