

ticatorio subdentato; caput subquadratum, supra nitidissimum, lœvигatum, punctulis dispersis piligeris, pilis minutissimis adpresso, absque pilis abstinentibus; laminae frontales absque dente recurvato; scapus disperse punctatus; funiculi articulus basalis secundo brevior, articulus secundus tertio vix longior; vertex inermis postice fortiter arcuatо excavatus; oculi nulli; pronotum et mesonotum haud pilosa, nitida, disperso punctulata; thoracis latera et metanotum inerme opaca et densissime punctata, partim coriacea, petiolus subtiliter coriaceo-rugulosus et disperse punctatus, supra pilis abstinentibus nonnullis, segmento antico rotundato-cuboideo, infra dente acuto, segmento postico rotundato-subcuboideo, antico latiori, antice paulo angustior quam postice et paulo breviore quam latiore, infra antice tuberculo antrorsum directo; abdomen lœve, nitidum, modice pilosum, pedes graciles, haud dense pilosi, unguiculis simplicibus.




Fig. 19. — Obreras pequeña y grande de *Ecton (Acamatus) Strobeli* vistas de arriba y cabezas de frente. Aumento: más o menos 10 diámetros.

*E. coeci* Ltr. (vastatori Sm.) simillima difert unguiculis simplicibus et capite atque thorace vix abstante pilosis, a ceteris speciebus distincta est oculis carentibus, metanoto inermi, tibiis haud compressis et unguiculis simplicibus.

*Inventus nidus* hujus speciei prope urbem Buenos Aires, anno 1866. — *Str.* ».

*Obrera.* (Fig. 19). L. 2,8 - 6,5 mm. Rojiza, lustrosa, las mandíbulas y las mejillas castaño oscuro en la parte anterior; las mandíbulas fuertemente estriadas, con el margen masticatorio subdentado; cabeza subcuadrada, muy lustrosa por arriba, lisa, con puntos pi-