

«*Labidus Strobeli.*

*Mas:* Long. corp. 16 mm., long. alae ant. 17 mm. Testaceo - rufo, vertice, mesonoto partim, scutello et petioli disco, nonnumquam etiam pronoto partim et metanoto plus minusve infuscatis aut nigricantibus, oculis nigris; copiose flavo - sericeo - adipresae pubescens, caput supra, thorax et petiolus infra, abdominis pars postica et coxae dense, thoracis et abdominalis dorso disperse abstante pilosa; caput parvum; mandibulae ad basim subrectae, ante apicem curvatae; laminae frontales brevissimae; scapus brevis ocellum lateralem haud attingens, funiculus long. 4,8 mm., sulcus frontalis ad ocellum anticum extensus; ocelli in linea curvata siti, laterales in verticis parte altissima; thorax antice supra capitem productus; scutelli discus fere in eodem planicie disci mesonoto; metanoti pars basalis in medio brevissima, lineola brevi indistincta longitudinali, pars declivis subverticalis, plana, marginibus lateralibus rotundatis; petiolus abdomine paulo angustior, brevior quam latior, disco convexo, infra tuberculo instructus, marginibus lateralibus parallelis, angulis anticis fortiter rotundatis, posticis rotundato - rectangularibus; abdomen inter segmenta, praecipue supra, paulo constrictum; alae anticae costi rufo - testaceis, ramo cubitali externo (costa transverso - cubitali prima) inter cellulæ 2 cubitales sigmoideo, costae transversae parte interiore (transverso - cubitale secunda) recta, costae cubitalis ramo interno mox in medio conjunto costae recurrenti et deinde incrassato, cellula radiali postice acuminata; pedes breves absque pilis abstantibus.

Haec species pertinet ad Westwoodi (*Monograph Hym. group Dorylidae*) sectionem secundam petioli lateribus parallelis haud elevatis atque ad divisionem petiolo breviore quam latiore et pedibus brevissimis.

*Captus* frequens, in aedibus nocturno tempore, lumine attractus, advolans, in provinciis San Luis, Mendoza (San Carlos) et Buenos Aires (Bahía Blanca); mensibus aestivis, Decembre usque ad Februarium, annis 1865 ad 1867.—*Str.*».

· *Macho.* (Fig. 20). Longitud del cuerpo 16 mm., long. ala anterior 17 mm. Rufo testáceo, con el vértice, parte del mesonoto, escudo y disco del pecíolo y algunas veces también parte del pronoto y el metanoto [epinoto] más o menos parduzcos o negruzcos, ojos negros; con abundante pubescencia adherente amarillo sedosa, con