

difieren tan considerablemente de cualquiera de las que he descrito, y como por comparación con el verdadero *Lab. Latreillii* citado más arriba, parece evidentemente diferente de él, por lo tanto propongo llamarlo:

«? Sp. II. *Lab. Pertii* [etc., ya transcrita]».

Por su parte Maximilianus Perty, en *Delectus Animalium Articulatum*, etc., 1830-1834 (Munich), p. 138, dice:

«*Labidus Latreillii* Jur. Tab. XVII, fig. II.

Totus badio-testaceus, albido-pubescentis; ocellis magnis, hyalinis; alis albis, nervis flavicantibus. Long. 7". Lat. prothor $1\frac{1}{2}$ ". Lat. alar. expans. 16".

Jurine, Nouv. Meth. de class. les Hymenop., fig. 282.

Latreille, Gener. Crust. et Ins., tom. IV, pag. 123.

Habitat in provincia Piauhiensi et in Brasilia australi.




Fig. 29. — Cabeza del macho de *Eciton (Acamatus) Pertyi* vista de frente, según Emery.

Quod ad staturam et habitum, imo etiam colorem et pubescentiam Dorylo valde similis. Quod est Dorylus in hemisphæra orientali, id est Labidus in hemisphæra occidentali».

Con descripciones tan incompletas no es sorprendente que Westwood no reconociera la especie y la describiese de nuevo bajo el nombre de *Labidus Fonscolombei* en la forma siguiente:

«Totus brunneo-testaceus, pubescens, abdомine subnitido, stigma-
te alarum rufo-testaceo, pedibus brevissimis.

Long. corp. lin. 7 [= 14,6 mm.]. Expans. alar. lin. $16\frac{1}{2}$ [= 34,37
milímetros].

Habit. Brasil. D. Miers.

Enteramente de un rojo parduzco, finamente pubescente, el abdo-
men más brillante y más bien lustroso. Cabeza pequeña, mandí-
bulas cortas y ligeramente encorvadas, muy peludas; faz con un