

dos, ángulos posteriores subdentados. Postpecíolo más distintamente impreso detrás. Negro o negropardusco. Long. 3 mm.
subesp. *sericea* Forel var. *semisericea* Santschi.

Crematogaster (Orthocrema) brevispinosa Mayr 1870

Mayr, *Sitz Ber. Akad. Wiss. Wien*, t. LXI, p. 403 y 404 ♀ 1870. Brasil.

Operaria. — Long. 3,2 mm. Picea, nitida, pilosa, scapo pedibusque pilis brevibus parum abstantibus; caput laevigatum, disperse punctatum, antece subtiliter striolatum; funiculi clava biarticulata; pronotum longitudinaliter striatum; mesonotum disco laevigato, leviter convexo; epinotum spinulis sursum directis, parte basali longitudinaliter striata, parte declive laevigata; petioli articulus primus subquadratus angulis anticis rotundatis, angulis posticis rectangularibus denticulis minutissimis prominentibus, articulus secundus absque sulco mediano; abdomen subtilissime coriaceo, rugulosum.

Nueva Granada (Lindig).

La especie típica no parece haber sido encontrada en la República Argentina hasta la fecha.

Mayr, *Verh. zool. bot. Ges. Wien* t. XX, p. 992, 1870.

CARACTERES DE LA ♀ SEGÚN LA CLAVE DE MAYR 1870

1. — Pecíolo adelante más angosto que atrás o de igual ancho, amenundo adelante poco más ancho que atrás, en cuyo caso la maza antenal es distintamente de dos artículos.
7. — Tibias con pelos finos cortos adyacentes o poco erectos (en *C. nigropilosa* con pocos pelos, medianamente largos, poco erectos).
13. — Pecíolo más o menos cuadrado o longitudinalmente oval.
16. — Frente, vértice y costados de la cabeza completamente lisos, aparte de los puntos dispersos.
19. — Epinoto con espinas no largas ni fuertemente curvas hacia atrás o con dos dientes.
20. — Epinoto con dos espinas más largas que su ancho en la base.