

- ramente quatro espinhos pequenos no vértex — Subgênero NEOATTA, n. 14
- 2 — Operária máxima com os espiráculos do peciolo distintos, sobre elevações cônicas salientes dos lados e perfeitamente visíveis de cima; operárias média e minor apresentando, além do par de espinhos occipitais, dois espinhos menores na parte anterior do vértex e quasi sempre, mais outros dois, ainda menores, situados na terminação superior de cristas frontais — Subgênero ARCHEATTA, n. 3
- Operária máxima com os espiráculos do peciolo vestigiais ou em elevações pouco salientes; operárias média e minor apresentando na parte superior da cabeça, sómente os espinhos occipitais — Subgênero ATTA, *n. Fabr* 5
- 3 — Lobos cefálicos e primeiro segmento do gáster da operária máxima glabros e brilhantes, apenas com o par de espinhos occipitais presente na parte superior da cabeça; dois grandes ocelos; sulco occipital raso, em ângulo obtuso; espinhos epinotais curtos, cônicos, dirigidos para trás, quasi na mesma direção do plano superior do epinotum; espinhos mesonotais anteriores sob a forma de grossos tuberculos curtos e rombos; côr parda avermelhada escura ... *mexicana* F. Smith, 1858
- Lobos cefálicos e gáster da operária máxima pilosos e foscos; cabeça apresentando, além dos espinhos occipitais, um par de espinhos fracos ou de saliências ou áreas brilhantes no vértex e mais dois ainda menores na parte superior da frente; ocelos, quando presentes, pequenos e inconspicuos; sulco occipital mais profundo, em ângulo agudo; espinhos epinotais mais alongados, espiniformes, com a parte distal delgada 4
- 4 — Cabeça da operária máxima apenas com os espinhos occipitais bem desenvolvidos, vértex com áreas brilhantes nos ângulos externos superiores, espinhos frontais pouco desenvolvidos ou ausentes; dois ocelos pequenos, quasi vestigiais; espinhos mesonotais anteriores cilindroides, rombos na extremidade e mais curtos que os epinotais; espinhos epinotais curvados para baixo; côr parda escura *insularis* Guérin, 1844
- Cabeça da operária máxima, além dos espinhos occipitais, com dois espinhos fracos no vértex; sem ocelos; espinhos ~~epi-~~ ^{MVA} ~~mesonotais~~ ^{anteriores} ~~notais~~ muito robustos, cônicos e ponteados, mais longos que os epinotais; espinhos epinotais espiniformes, rétos, não voltados para baixo; côr parda avermelhada ferruginosa *texana* Buckley, 1860
- 5 — Com um tufo de pêlos lanosos de cada lado da frente da operária máxima; ocelo anterior quasi sempre bem visível, os posteriores pequenos ou ausentes (*cephalotes*) 6
- Tufos de pêlos lanosos frontais e ocelos ausentes 12
- 6 — Tegumento do corpo e sobretudo da cabeça, liso e muito brilhante na operária de 7 mm. e nas menores *cephalotes polita* Emery, 1905