

- 18 — Cabeça e primeiro segmento do gáster da operária máxima pouco brilhantes ou mesmo foscos, mais ou menos pilosos, com pubescência deitada entremeiada de alguns pêlos erectos e com reticulação fina bem visível; dois ocelos muito pequenos; espinhos occipitais quasi na altura do vértex; espinhos mesonotais anteriores tuberculiformes ou cônicos e ponteados, menores que os epinotais; espinhos mesonotais posteriores reduzidos a tubérculos quasi sempre fundidos em um só; espinhos epinotais alongados, espiniformes, pouco divergentes, com a extremidade aguçada e dirigida para trás e um pouco para cima; tórax muito pouco rugoso
..... *robusta* Borgmeier, 1939
- Cabeça e primeiro segmento do gáster muito brilhantes e completamente glabros, sem reticulação fina, apenas com pontuação fina e esparsa, pouco aparente (*laevigata*) 19
- 19 — Pêlos erectos do pronotum e da parte anterior do tórax da operária máxima, abundantes; cabeça bem desenvolvida, podendo atingir 7,5 mm. de largura; lobos cefálicos arredondados, sem tubérculos; dois ocelos pequenos, às vezes ausentes; espinhos mesonotais anteriores grossos, cônicos, divergentes e mais curtos que os epinotais; os mesonotais posteriores formando um só tubérculo às vezes terminado em dois pequenos espinhos; os epinotais pouco alongados, espiniformes, dirigidos para trás e um pouco para cima; pernas com pêlos curtos; operária minor toda fosca e pilosa
..... *laevigata* (F. Smith, 1858)
- Pêlos erectos do pronotum muito raros ou ausentes 20
- 20 — Cabeça arredondada dos lados 21
- Cabeça angulosa dos lados, brilhante em grande parte; frente, lados do tórax e pernas, finamente granulados; poucos pêlos erectos e nenhuma pubescência no tórax; operária de 4 mm. com gáster brilhante — *laevigata lizeri* Santschi, 1922
- 21 — Espinhos epinotais mais longos que na espécie típica 22
- Espinhos epinotais mais curtos e mais finos que na espécie típica; pro-mesonotum e epinotum brilhantes mas pontuados; post-pecíolo não carenado superiormente e brilhante, embora pontuado e reticulado; operária máxima parda avermelhada clara; média da mesma cor no gáster e na parte inferior da cabeça e castanha escura na parte superior da cabeça e na inferior do tórax
..... *laevigata venezuelensis*, ssp. n.
- 22 — Parda avermelhada clara; parte do pro-mesonotum e espinhos mesonotais inteiramente lisos e muito brilhantes; pêlos curtos e pubescência, ausentes
..... *laevigata saltensis* Forel, 1913
- Parda enegrecida ou negra; como em *saltensis*, muito brilhante e pouco pontuada
..... *laevigata saltensis* var. *obscurata* Gallardo, 1916