

2 e 3. Trocantere di cospicue dimensioni. Tibio-tarso poco più breve del femore. Unghia lunga circa due terzi del tibio-tarso, leggermente falcata, fornita di 2 setole.

Sistema tracheale olopneustico, con 1 paio di spiracoli tracheali (bifori; fig. XXII, 4) latero-ventrali nella regione anteriore del secondo segmento toracico (quasi in posizione intersegmentale) e 8 paia laterali nei primi 8 uriti.

ELENCO DEGLI IMENOTTERI ACULEATI

ENTRATI A FAR PARTE DELLE MIE COLLEZIONI NEL 1934 ⁽¹⁾.

Bethylidae.

- **Bethylus fuscicornis* Jur. ⁽²⁾. - Un esemplare nella Valle delle Pozze (Appennino Modenese) il 27 agosto.
- **Pseudisobrachium subcyaneum* Hal. - Due esemplari a Bazzano (Emilia) l'8 giugno.
- **Epyris niger* Westw. - Un esemplare a Bazzano l'8 giugno.
- **Scleroderma abdominale* Westw. - Un esemplare al Lido di Venezia il 2 luglio.
- * > *domesticum* Latr. - Un esemplare a Venezia il 15 agosto.
- * > » *brevicorne* Kieff. - Un esemplare a Venezia il 25 agosto.
- **Parascleroderma Berlandi* Man. - Un esemplare nella Valle delle Pozze il 19 agosto 1931.

⁽¹⁾ Le specie il cui nome è preceduto da un * non sono comprese negli elenchi precedenti; le altre sono state già da me citate, ma di diversa località. L'elenco delle Formiche racchiude tutte quelle attualmente esistenti nelle mie collezioni. Pochissime forme della presente nota provengono da località non italiane; la maggioranza di esse è rappresentata da cotipi o da paratipi di DUSMET. Le specie dei dintorni di Venezia sono state raccolte dal Signor A. GIORDANI SOIKA; varie Formiche e qualche altro Imenottero dal Signor CARLO MENOZZI.

⁽²⁾ Le specie sono elencate in ordine alfabetico; i generi e i sottogeneri, quando non sia indicato particolarmente, secondo: **Schmiddeknecht O. e C.** - *Die Hymenopteren Nord- u. Mitteleuropas.* - II ed., 1930.