

bispinoso, nodo primo infra mutico; femoribus cruribusque apice valde inflatis, antennis abdomineque fuscis. — Long. du neutre, 5 millim.

Le corps est d'un fauve assez vif, avec les pattes plus pâles, et couvert de petits poils blancs assez clair semés. Les antennes sont peu renflées, brunes, avec la base du premier article fauve. La tête est assez grande, finement striée dans le sens longitudinal. Les yeux sont noirs, ainsi que le bord dentelé des mandibules. Le thorax est assez allongé, peu bossu en avant, comprimé latéralement, et même étranglé avant le milieu. Il est finement strié longitudinalement, comme la tête, et terminé en arrière par deux longues épines divergentes et aiguës, ayant à peu près la moitié de sa longueur. Les pattes sont grandes, avec les cuisses et les jambes fortement renflées près de l'extrémité. Les tarsees sont beaucoup plus longs que les jambes, surtout les intermédiaires et postérieurs, qui ont leur premier article extrêmement long. Les deux nœuds, ou premiers articles de l'abdomen, sont lisses, globuleux, presque égaux. Le premier est précédé d'un pédicule assez allongé et mince, n'ayant aucune dent ou épine en dessous. Ce premier nœud est séparé du second par un étranglement; il est un peu plus petit. La portion suivante de l'abdomen est ovalaire, à peu près de la grosseur de la tête, d'un noir luisant tirant sur le fauve vers sa base, chez quelques individus, lisse et faiblement garni de petits poils blancs ou gris.

La femelle est plus grande que le neutre (long. 7 mill.), à peu près semblable pour les stries et la coloration, si ce n'est que le sommet de la tête porte trois petits yeux lisses entourés de noir; que l'écusson du mésothorax est noir, et que la base du premier segment abdominal est fauve jusqu'au tiers au moins de sa longueur. Les ailes sont demi-transparentes, très-faiblement jaunâtres, avec les nervures et le stygmate jaunes. Ces nervures sont exactement représentées planche 5, fig. 5.