

p. 554), a changé le nom de cette dernière, et l'a appelée *F. analis* (Latr., p. 282).

Fabricius a persisté (*Syst. piez*, p. 404) à donner à son espèce le nom de *foetens*, quoiqu'il sût bien, par l'ouvrage de Latreille et d'Olivier (*Encycl.*, 6, p. 505), que ce nom avait été employé antérieurement, et il a mis, fort à tort, le nom de Latreille en synonymie. Pour que l'on ne puisse lui reprocher ce petit tour, il a eu bien soin de ne pas parler de la *Formica foetens* de De Geer et Olivier; et, s'il l'a décrite quelque part, c'est sous un autre nom, et sans citer ces auteurs.

On trouve aussi, dans Latreille, une *Formica foetida*, qu'il ne faut pas confondre avec la *foetens*, car elle n'a qu'un nœud.

M. Sallé a trouvé dans le même nid une autre *Myrmica* très-voisine de la *M. Sallei*, mais ayant le thorax plus rétréci en arrière, les deux épines plus courtes, les antennes entièrement d'un fauve pâle, et surtout la tête couverte de plusieurs carènes longitudinales continues d'avant en arrière. Ces carènes se terminent aux bords latéraux, qui forment ainsi un angle, tandis que ces mêmes bords sont tout-à-fait arrondis chez la *M. Sallei*. Chez cette nouvelle espèce, les antennes sont insérées à une distance plus grande, sur les côtés du bord antérieur. Nous n'avons vu qu'un seul individu neutre de cette espèce, que nous proposons de nommer provisoirement *Myrmica cariniceps*.

Explication de la planche 3.

Fig. 1. Nid de la *Myrmica Sallei*, de grandeur naturelle.
 — 2. *Myrmica Sallei* neutre; grossie. — 2 a. Une de ses pattes antérieures. — 2 b. Sa tête. — 5. La femelle. — 5 a. Sa tête. — 4. Tête du mâle. — 4 a. Son aile. — 5. Nœuds de l'abdomen de la *Myrmica rubra* femelle.