

---



---

**Estratto dal Bollettino della Società Entomologica Italiana**

Anno LXII, N. 8 — 15 Ottobre 1930, VIII

BRUNO FINZI

**CONTRIBUTO ALLO STUDIO DEGLI APHAENOGASTER PALEARTICI**

(FORMICIDÆ-MYRMICINAE)

Le note che seguono contemplano soltanto alcuni *Aphaenogaster* paleartici e riproducono le osservazioni fatte sopra parte delle specie e varietà esistenti nella mia collezione e in quella del Museo di Storia Naturale di Vienna (coll. G. Mayr), messe gentilmente a mia disposizione dal dott. F. Maidl.

La revisione degli *Aphaenogaster* paleartici pubblicata dall'Emery nel 1908 <sup>(1)</sup> è l'unica che possediamo di questo genere ed è, salvo poche e insignificanti inesattezze nella valutazione di alcune razze, ancora eccellente; da quell'anno sono state descritte però moltissime forme. Il dott. Santschi ha pubblicato recentemente <sup>(2)</sup> la descrizione di parecchie ♀♀ delle razze dell'*Aph. testaceo-pilosa*, dandone anche i profili dell'epinoto e dei peduncoli. Il Dott. Müller <sup>(3)</sup> ha studiato le forme della Venezia Giulia e Dalmazia, dando la descrizione di ♀ e ♂ non ancora conosciuti.

**A. pallida** Nyl. s. l. ♂

1. Fronte, vertice, lati del capo più o meno distintamente zigrinati . . . . . 2.
- Capo dietro le fosse antennali quasi del tutto liscio . . . 3.

(1) Emery — Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 309-338.

(2) Santschi — Ann. et Boll. de la Soc. Ent. Belg. 1929, p. 139-141.

(3) Müller — Boll. Soc. Adr. Sc. Nat. Trieste 1923, p. 47-58.