

no rosso. Arti picci o bruni; antenne di solito bruno giallastre, con la parte apicale ingrossata dello scapo bruno scura.

L. 2,5 - 3,5 mm.

♀ dealata.

Capo opaco e piuttosto sericeo; fronte rugosa, ma lucida; la linea frontale raggiunge quasi gli ocelli; area frontale liscia e lucida; clipeo con carena distinta; mandibole lisce e lucide. Scapo lungo 1,2 mm. leggermente curvato verso la base e ingrossato all'apice. Pochi peli eretti disposti su due file ai lati delle lamine frontali e sul clipeo. Diametro degli occhi lungo un terzo, o poco più, della massima lunghezza del capo, visto di lato senza le mandibole.

Il capo è bruno, con le antenne, mandibole e palpi gialli. Parte inferiore del capo senza peli eretti.

Torace depresso; scudo del mesonoto largo e piano; la parte medio - anteriore di esso con un leggero solco longitudinale; tutto il torace è opaco e sottilmente punteggiato, del colore del capo, con lo scutello, pleure e singoli tratti dell'epinoto giallo bruni. La parte superiore del torace porta una decina di peli eretti, mentre i lati dell'epinoto sono piuttosto sericei. Zampe giallo brune; tibie e femori con rada e sottile pubescenza aderente.

Squama debolmente scavata nel mezzo, ma distintamente bispinosa.

Gastro sericeo con riflessi bronzii; peli eretti più o meno copiosi disposti però regolarmente sui margini dei segmenti; di solito più numerosi su quelli dei segmenti apicali.

L. 4,5 - 5,5 mm.

Ho descritto dettagliatamente la ♀, riportando pure alcuni caratteri dell' ♂, perchè, secondo quanto ho studiato, il gruppo dell'*Acantholepis frauenfeldi* che comprende le varietà *nigra*, *melas*, *splendens*, *Karawaiewi* non è assolutamente ben differenziato. Recentemente il collega Menozzi ha determinato per var. *nigra* un' ♂ del Sinai; io ho ricevuto dall'Egitto mediterraneo una serie di ♂ appartenenti al gruppo citato che sono però distinte dalla varietà *nigra* per la forma delle spine epinotali, molto sviluppate; queste ♂ egiziane si connettono forse per la forma del torace - non per la scultura - al gruppo orientale *Karawaiewi*.

*Camponotus compressus sanctus* var. *cosensis* Forel

Emery, Deutsche Ent. Zeit. 1908, p. 195; Genera Insectorum, Camponotinae, 1925, p. 98.

♂. Parecchie ♂ di Spies e Califea.

♀. Alata.

Capo picco con striatura fittissima e superficiale, visibile con forte