

lucida; clipeo con carena mediana molto distinta; linea frontale distinta; peli eretti sotto il capo più o meno numerosi; mandibole e funicolo giallo scuri, il resto piceo. Scapo lungo 2,4 mm.

Torace punteggiato come il capo; la punteggiatura dello scutello è più profonda e regolare, dandogli l'aspetto d'essere piuttosto striato; la faccia basale dell'epinoto continua in quella discendente senza formare un angolo; lati inferiori del torace lisci e lucidi. Ali giallastre. Zampe gialle; tibie con peli rialzati, ma poco numerosi; tibia posteriore lunga 2,8 mm., torace più o meno bruno piceo, con le pleure gialle. Il mesonoto porta pochi peli eretti sulla parte mediana del disco; i peli sono più lunghi e numerosi sullo scutello e sull'epinoto.

Squama grossa, prismatica, bassa circa quanto la metà dell'altezza del segmento basale del gastro, fornita di lunghi peli sulla parte superiore.

Gastro liscio, lucido, allungato, non più largo del torace, fornito di peli lunghi, biancastri, non numerosi, disposti come nella ♀. Colore del gastro piceo. Piastra subgenitale trapezoiforme, incavata sul margine anteriore; stipiti più o meno cilindrici; vista di lato la sagitta appare incavata longitudinalmente nella sua parte mediana e piegata all'infuori all'apice.

L., senza le ali, 11 mm; ala anteriore 8 mm.