

RACCOLTE ENTOMOLOGICHE NELL'ISOLA DI CAPRAIA

FATTE DA G. MANCINI E F. CAPRA (1927 - 1931)

II

BRUNO FINZI

FORMICIDAE

Nel suo lavoro sulle formiche delle isole italiane (1) l'Emery annovera quattro specie dalla Capraia e precisamente:

Aphaenogaster testaceo-pilosa spinosa var. *nitida* Emery.

Tetramorium meridionale Em.

Lasius flavus L.

Camponotus aethiops Latr.

Oltre a queste A. Razzauti cita ancora le seguenti: (2).

Messor barbarus var. *nigra* André.

Crematogaster scutellaris Ol.

Camponotus lateralis Ol.

Le diligenti ricerche del collega rag. Mancini eseguite durante i suoi cinque viaggi, compiuti in mesi diversi, hanno elevato notevolmente il numero di specie finora conosciute, come dimostra l'elenco che segue. Ringrazio l'amico Mancini per avermi voluto affidare lo studio del materiale raccolto che dal lato corologico è del più grande interesse.

* * *

Ponera coarctata var. *testacea* Em.

Aphaenogaster subterranea Latr.

Aph. testaceo-pilosa spinosa var. *nitida* Em.

Molte ♀ raccolte un po' dappertutto e un ♂ catturato a S. Rocco nel giugno 1931.

Nel suo lavoro sugli *Aphaenogaster* paleartici (Deutsche Ent. Zeitschrift 1908, p. 321) l'Emery scrive che le ♀ e i ♂ di questa varietà « lassen sich von der Stammform der Unterart nicht unterscheiden ». Descrivo brevemente il ♂ citato perchè il profilo dell'epinoto mi sembra differente da quello della subsp. *spinosa* della Sardegna disegnato dall'Emery.

— Capo fittamente punteggiato, piuttosto lucido nella parte anteriore e mediana; occipite opaco; mandibole striate; scapo lungo circa

(1) Annali del Museo Civico di Storia Nat. di Genova, 1915, pp. 244-270.

(2) Atti della Soc. Toscana di Sc. Nat., Pisa, 1917, pp. 196-224.