

Plagiolepis pygmaea Latr.

Camponotus aethiops Latr.

Camp. lateralis Oliv.

Camp. piceus Leach.

Lasius niger L.

Las. alienus Foerster.

Las. flavus Fabr.

Las. carniolicus Mayr. — Di questa rara ed interessante specie il rag. Mancini raccolse una femmina alata nell'ottobre 1927.

*
* *

Tutte le formiche comprese in questo elenco si trovano sul continente o su parte di esso. Il *Leptothorax exilis* var. *leviceps* è, come scrive anche l'Emery nella sua monografia sulle formiche d'Italia, più « spiccatamente bicolore » che quelli del continente; alcune ♂♂ dell'isola d'Elba sono identiche a quelle di Capraia. Per quanto riguarda le formiche quest'isola appartiene naturalmente al gruppo faunistico sardo-corso-toscano e la distribuzione geografica dell'*Aph. testaceo-pilosa spinosa* var. *nitida* ne è la prova più eloquente. Molto interessante è la cattura del *Lasius carniolicus*, formica descritta da Lubiana e trovata più tardi qua e là in Europa. (Francia meridionale, isola di Gotland, Russia meridionale, Catalogna, Dalmazia, e in Italia nel Piemonte, Liguria, Emilia).

Estratto dalle Memorie della Società Entomologica Italiana

Vol. XI — 1932

(Pubblicato il 5 Febbraio 1933 - XI)