

62. Camponotus rufoglaucus var.

Un' ♀ di Hamman, 15.3.1935 che puo' esser riferita ad una delle tante varietà del *rufoglaucus*.

63. Camponotus sericeus F.

Camponotus sericeus Mayr, Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1862, pag. 675, fig. 4.
Camponotus sericeus F., Emery, Gen. Ins., 1925, pag. 125.

♀ ♀ Oasi di Siwah, 26.3.1933.

Hab.: Africa tropicale, Cirenaica, Egitto, Arabia, Indostan, Indocina, Ceylon.

Tabella delle ♀ ♀ dei *Camponotus* egiziani:

1. Gastro coperto di fittissima pubescenza aderente in modo da farlo apparire sericeo splendente; di profilo la faccia dorsale dell'epinoto è nettamente staccata da quella discendente; quest'ultima è incavata nel mezzo *sericeus*
- Gastro con peli lunghi sparsi più o meno abbondantemente al margine dei tergiti; di profilo la faccia dorsale dell'epinoto continua in quella discendente in curva quasi continua 2
2. 44. Gastro con alcune macchie gialle disposte ai lati; torace di solito giallo; peli al margine dei tergiti gastralii più numerosi; pronoto di solito più lucido; capo di sotto con alcuni peli eretti *maculatus aegyptiacus*
- 44. Gastro bruno; torace del colore del gastro o leggermente più chiaro; peli al margine dei tergiti gastralii meno numerosi; pronoto di solito opaco; capo di sotto senza peli eretti *compressus thoracica fellah*

64. Polyrhachis simplex Mayr.

Polyrhachis simplex Bingham, Fauna Brit. India, Hym., Vol. 2, 1903, pagg. 384, 394.

Una serie di ♀ ♀ raccolte a Wadi Feran (Sinai) il 4.3.1935.

Hab.: Birmania, Indostan, Ceylon, Mesopotamia, Palestina, Transgiordania, Sinai.

65. Paratrechina jaegerskjoeldi Mayr.

Prenolepis jaegerskjoeldi Mayr, Res. Swed. Zool. Exp., 1905, pag. 8.

Prenolepis jaegerskjoeldi Karawajew, Revue russe d'Ent., 1911, pag. 9.

Paratrechina jaegerskjoeldi Alfieri, Bull. Soc. Roy. Ent. d'Egypte, 1931, pag. 47.

Numerosi esemplari raccolti a: ♀ ♂, Helouan, 2.3.1933; ♀ ♂ ♀ Alessandria (Mex), 3.4.1933; ♀ Oasi di Siwah, 26.3.1933; ♀ Gebel Asfar (Cairo),