

7. Forme conosciute da tutta l'Africa del Nord
1. *Ponera ragusae* var. *santschii* (x).
 2. *Messor aegyptiacus*.
 3. *Messor aegyptiacus* var. *foreli* (x).
 4. *Messor arenarius*.
 5. *Messor rufotestaceus* (x).
 6. *Pheidole pallidula arenarium* var. *recticeps*.
 7. *Pheidole sinaitica* (x).
 8. *Cardiocondyla nuda* var. *mauritanica*.
 9. *Monomorium salomonis* var. *sommieri*.
 10. *Monomorium salomonis* var. *obscurata*.
 11. *Monomorium salomonis* var. *didonis*.
 12. *Monomorium subopacum* (x?).
 13. *Monomorium subopacum* var. *phoenicia*.
 14. *Solenopsis lou* (x).
 15. *Plagiolepis pallescens maura* var. *atlantis*.
 16. *Cataglyphis albicans*.
 17. *Cataglyphis bicolor nodus* var. *desertorum*.
 18. *Cataglyphis bombycinus*.

Le forme segnate con (x) mancano in Cirenaica.

8. Forme della Cirenaica e dell'Africa
nord-orientale

1. *Pheidole jordanica*.
2. *Crematogaster inermis antaris* var. *nigriceps*.
3. *Camponotus maculatus* subsp. *aegyptiaca*.
4. *Cataglyphis albicans livida* var. *aurata*.
5. *Cataglyphis bicolor nodus* var. *savignyi*.
6. *Cataglyphis bicolor* subsp. *nigra*.

9. Forme dell'Egitto e in genere del Mediterraneo
orientale e dell'Asia occidentale

1. *Dorylus fulvus* var. *punicus*.
2. *Messor minor aralocaspicus* var. *tamerlani*.
3. *Messor semirufus* var. *maculifrons*.
4. *Messor semirufus* var. *ebeninus*.
5. *Cardiocondyla elegans* var. *sahlbergi*.
6. *Crematogaster jehovae*.
7. *Crematogaster inermis*.