

96. **Gonimbrasia hyperbius** Westw. Ein männliches Exemplar wurde ebenfalls am Longa oberhalb des Lazingua am 19. Januar 1900 gefangen.

97. **Imbrasia obscura** Butl. Maass. Ein weibliches Exemplar am Kampuluve unweit des Kuito am 26. Februar 1900. Nach Professor Karsch ist diese Art epimethea Drury. (Vergl. Berliner Entomol. Zeitschr. 1892, pag. 499.)

### Noctuiden.

98. **Achaea chamaeleon** Guen. Ein Exemplar am Longa oberhalb des Quiriri 10. Januar 1900.

### Geometriden.

99. **Boarmia acaciaria** Boisd. Ein Exemplar am Kubango oberhalb Massaca 10. Oktober 1889.

100. **Macaria trirecurva** Saalm. Ein Exemplar am Onschingue unweit des Kuito 1. April 1900.

## Einige neue Ameisen aus Süd-Angola.

Von Dr. A. Forel.

**Pachycondyla (Bothroponera) Picardi** n. sp. ♂ L. 5,5 mill. Nahe *crassa* Emery, aber viel kleiner. Die Mandibeln sind viel schmaler und haben einen langen, sehr schiefen siebenzähligen Endrand; sie sind glänzend, weitläufig punktiert. Kopf länglich-rechteckig, um  $\frac{1}{3}$  länger als breit, hinten seicht ausgerandet. Schuppe so lang wie vorne breit (kürzer bei *crassa*), vorne sehr scharf gestutzt. Die grossen, haartragenden Grübchen, die bei *crassa* gerade am Kopf am reichlichsten sind, fehlen am Kopfe ganz und sind am übrigen Körper sehr zerstreut. Sonst wie *crassa*, aber die Beine, Fühler und Mandibeln dunkler, mehr braun. Die gleichen grossen Augen, Skulptur, Behaarung etc.

Zwischen den Flüssen Kubango und Kuito, Westafrika. Durch Herrn Baron v. Picard erhalten (von den Herren Baum und Van der Kellen gesammelt).

Ausser der Grösse durch die Skulptur, den länglicheren Kopf und die schmälere Mandibeln von *crassa* zu unterscheiden.