



Fig. 1. A: *A. cardenai* n. sp. Vista de perfil. B: Escapo de *A. cardenai* con pilosidad característica.

eje del mismo en la parte proximal y media, aunque algo levantada hacia la parte distal. Tórax poco piloso (unos 15 pelos en el ejemplar, subrectos, en el pronoto y mesonoto). Pecíolo y postpecíolo con pilosidad dirigida hacia atrás. Abdomen con pilosidad esparcida, poco abundante, de 0.10 mm; foseetas pilosas muy visibles. Apéndices con pilosidad subdecumbente hasta casi aplicada.

Mandíbulas triangulares, fuertes, con dos dientes apicales mayores que el resto en una de ellas; la otra está rota en la parte distal. Tienen unas estrías que se dicotomizan hasta el borde masticador, que es liso.

Cabeza casi tan ancha como larga (relación de 1.1) con los lados formando una curva casi continua hasta el occipucio, sin ángulos posteriores. Existe un reborde en la cara occipital, muy corto. Los lados, por la parte anterior de los ojos, son casi rectos hasta la base mandibular. Clípeo con una incisión anterior poco profunda, casi completamente liso y brillante. Ojos pequeños, de una 40 facetas,

de una longitud aproximada de 1/8 de la cabeza.

Antenas muy largas, rebasando en casi la mitad de su longitud por detrás del occipucio, 1.25 veces más largas que la cabeza. Artejos funiculares casi el doble de largos que anchos. Escapo estriado longitudinalmente. Cabeza brillante, con estrías muy separadas, más densas en la parte anterior de los ojos, casi nulas en el occipucio.

Pronoto brillante, con pocas estrías. Resto del tórax rugoso, aunque brillante. Espinas espinotales muy características, largas y finas, algo curvadas, y divergentes en vista superior. Índice de las espinas (según BUSCHINGER): 2.75.

Pecíolo y postpecíolo superficialmente punteados, algo brillantes.

Abdomen completamente liso salvo la base del primer terguito con algunas estrías divergentes hacia atrás, no del tipo del subgénero *Aphaenogaster*.

Patas delgadas y largas, con los espolones bien desarrollados.