



Fig. 2. A: Tórax (pilosidad omitida), pecíolo, postpecíolo y parte anterior del gaster, en visión dorsal. B. pp III. C: espolón de pp III a mayor aumento. D: cabeza, en vista superior, pilosidad omitida.

Medidas

Long. total	6.375
Long. cabeza	1.45
Long. escapo	1.825
Long. funículo	2.525
Long. Ø largo ojo	0.175
Long. Ø corto ojo	0.15
Anch. cabeza (máxima)	1.3
Anch. tórax (máxima)	0.775
Long. espinas	0.4
Dist. puntas espinas	0.475
Long. pecíolo	0.6
Long. postpecíolo	0.4
Anch. pecíolo	0.275
Anch. postpecíolo	0.375
Alt. pecíolo	0.4
Alt. postpecíolo	0.375
Long. fémur III	1.96
Long. tibia III	1.56

POSICIÓN SISTEMÁTICA

Esta especie pertenece al subgénero *Atto-myрма* Emery, 1915 por la pilosidad fi-

na, inclinada, y por el abdomen liso en su mayor parte.

Las especies más próximas son *A. ovaticeps* (Emery, 1898) con la subsp. *muelleriana* Wolf, 1914 y *A. splendida* (Roger, 1859).

De *ovaticeps* difiere por las espinas mucho más largas aunque FINZI (1927) admite cierta variabilidad en la longitud, sin dar, empero, límites; también se separa por la cabeza brillante y pilosidad más abundante, sobre todo en tibias, y nudo peciolar redondeado. Por comparación con las descripciones y esquemas de la bibliografía y con dos obreras de Ragusa (U. Sahlb) de la colección Forel. *A. ovaticeps* s. str. está citada únicamente de Génova.

La subsp. *muelleriana* fue descrita en base a diferencias de tamaño y escultura; el material visto en la colección Forel, 3 obreras, cotipos, de Trieste (Finzi leg.) es claramente diferente del nuestro, siendo la cabeza sólo algo más brillante que en *ovaticeps*; el resto de diferencias con