

Pilosidad.—En todo el cuerpo, incluida la gula, hay dos tipos de pilosidad: una larga, suberecta y subdecumbente (WILSON, 1955) y otra más corta, casi adherida al cuerpo. Apéndices con pilosidad decumbente.

Mandíbulas grandes, con 8-9 dientes bien desarrollados (Fig. 1 A) disminuyendo de tamaño desde el apical hasta la base; el diente basal es característico, más desarrollado que los anteriores y dirigido hacia la boca. Superficie mandibular estriada.

Clípeo característico, igual que en la obrera, cóncavo y algo rugoso. Cabeza más ancha por delante que por detrás. Estriada en las fosetas antenales y entre las láminas frontales, va volviéndose lisa hacia el occipucio. Puntuación bien visible, correspondiente a los puntos de inserción de las setas. El escapo llega al nivel de los ocelos posteriores. Artejo 1 del funículo doble de largo que ancho; artejos 2 a 7 igual de largos que anchos; artejos 8 a 10 algo más largos que anchos; último artejo casi doble de largo que ancho. Maza antenal de cuatro artejos (Fig. 1 B).


Los ojos, al igual que la obrera, están muy cercanos al borde mandibular (Fig. 1 C). Cabe señalar que los ojos son pubescentes, aunque las setas son cortísimas (0,03 mm.) y curvadas, detalle que también hemos observado en las obreras de cuatro muestras de diferentes lugares de España, y que puede ayudar en la determinación específica.

Tórax más estrecho que la cabeza, doble de largo que de ancho. Pronoto ligeramente estriado lateralmente. Escudo y escutelo con una puntuación visible y una reticulación muy superficial, alutácea (EADY, 1968). Mesosterno y mesopleuras estriadas longitudinalmente en parte. Parte dorsal del epinoto con algunas estrias transversales poco marcadas; el intervalo entre las espinas es liso. Espinas cortas, como en la obrera (Fig. 1 C).

Peciolo y postpeciolo lisos en la parte superior, algo rugosos lateralmente.

Abdomen liso con pilosidad más abundante y larga que el resto del cuerpo.

Alas como en la fig. 2, más largas que el cuerpo, con las nerviaciones amarillentas, poco visibles. Estigma visible, más oscuro.



Ala anterior de la hembra de *Goniomma blanci* (André).

Dos células cubitales, una discoidal y la radial abierta, siguiendo las características del género (EMERY, 1922).

Para las medidas, véase el cuadro adjunto.