

Cuadro 1.—Medidas (en mm.) en las hembras de *G. blanci* (André)

Longitud total (mandíbulas ex.)	5,10	4,90	5,27
Alas anteriores	6,12	5,95	6,46
Longitud cabeza (mandíbulas ex.)	0,99	0,97	1,02
Anchura cabeza (detrás ojos)	1,02	1,02	1,06
Anchura cabeza (ojos incluidos)	1,10	1,08	1,14
Escapo	0,72	0,68	0,76
Funiculo	1,24	1,19	1,19
Long. máx. ojos	0,35	0,34	0,36
Anch. máx. ojos	0,18	0,18	0,18
Ojos-base Md.	0,08	0,06	0,08
Anchura tórax	0,80	0,76	0,85
Longitud tórax	1,57	1,53	1,57
Anchura peciolo	0,25	0,25	0,25
Altura peciolo	0,35	0,34	0,37
Anchura postpeciolo	0,39	0,37	0,40
Altura postpeciolo	0,35	0,34	0,37
Dist. puntas espinas	0,34	0,32	0,37
Long. pata III (coxa incluida)	3,70	3,65	3,82

MATERIAL ESTUDIADO

Tres hembras, Sierra del Alto Rey (Guadalajara), 18-X-77, a 1.850 m., J. Muñoz *leg.*

Genotipo: una hembra en la colección de uno de los autores (X.E.G.). Paragotipos: dos hembras, una en la colección del recolector y otra en la colección del Departamento de Zoología de la Universidad Autónoma de Barcelona.

DISTRIBUCION

Marsella (Francia) (ANDRÉ, 1881) *loc. typ.* Barcelona: Avenc Toni, Sot del Bac (O. Escolá *leg.*). Guadalajara: Sierra del Alto Rey (J. Muñoz *leg.*). Granada: Sierra Elvira (A. Tinaut *leg.*). Madrid: El Escorial; Sierra de Guadarrama (COLLINGWOOD & YARROW, 1969). Toledo: Toledo (F. J. Acosta *leg.*).

Aunque la localidad típica se encuentra en Francia, la distribución de esta especie aparece como claramente ibérica y repartida por una zona muy amplia de la península.

Cabe destacar que no ha sido encontrada de nuevo en Francia a pesar de que la parte mediterránea de este país es una de las zonas mejor conocidas en su fauna mirmecológica de toda Europa.

BIBLIOGRAFIA

- ANDRÉ, E., 1881. Description de trois nouvelles espèces de fourmis. *Ann. Soc. ent. Fr. (Ser 6)*, 1: 48-50.
 COLLINGWOOD, C. A. & I. H. H. YARROW, 1969. A survey of Iberian *Formicidae*. *Eos*, 44: 53-101.
 EADY, R. D., 1968. Some illustrations of microsculpture in the *Hymenoptera*. *Proc. R. ent. Soc. Lond. (A)*, 42: 66-72.
 EMERY, C., 1908. Beiträge zur Monographie der Formiciden des paläarktischen Faunengebietes (Hym.) III. *Deutsch. ent. Zeit.* 4: 437-465.