

mer tergito que es amarillo rojizo. Patas amarillo castaño con los fémures algo más oscurecidos.

Mandíbulas levemente estriadas, con 5 dientes: apical fuerte, subapical menor y 3 basales poco desarrollados.

Cabeza más larga que ancha: longitud/anchura sin ojos = 1.25 - 1.29 - 1.35; occipucio recto o ligeramente convexo, con los ángulos occipitales redondeados. Clípeo brillante, con estrías longitudinales que llegan a desaparecer en los ejemplares menores. Área frontal lisa y brillante. Cabeza brillante con estrías longitudinales junto a las láminas frontales; estrías concéntricas rodeando las fosetas antenales: en la parte anterior lateral de los ojos las estrías pasan a reticulación. Occipucio liso. En los ejemplares del norte de la Península la estriación está uniformemente menos desarrollada, llegando algunas obreras pequeñas a tener la cabeza casi totalmente lisa.

El escapo llega al borde occipital; longitud escapo/anchura cabeza: 0.86 - 0.98 - 1.00. Palpos maxilares de 5 artejos, labiales de 3 artejos. Tórax más largo que ancho: longitud tórax/anchura máxima: 1.75 - 1.93 - 2.07; sutura promesonotal bien visible. De perfil, el surco mesoepinotal está muy desarrollado, más marcado en las obreras menores. Disco del pronoto y mesonoto lisos y brillantes. Algunas estrías laterales en el pronoto que pasan gradualmente a una reticulación poco desarrollada en las pleuras y epinoto. Espinas cortas, dirigidas hacia arriba en la mayoría de los casos. Índice de Buschinger: 1.00 - 1.12 - 1.37.

Nudo peciolar alto, brillante aunque con reticulación superficial, con perfil en ángulo agudo y algunas estrías longitudinales en la cara descendiente. Longitud peciolo/altura nudo: 1. Cara anterior ligeramente cóncava. Postpeciolo trapezoidal en vista superior, brillante, reticulado superficialmente y con algunas estrías longitudinales posteriores. Anchura/longitud: 1.23 - 1.35 - 1.50.

Gaster liso y brillante.

#### HEMBRA

Longitud: 3.55 - 3.67 - 3.90 mm (medidas en 10 hembras).

Gracilidad: 4.36 - 4.60 - 4.95.

Coloración. Cabeza castaño a castaño oscuro; antenas y mandíbulas amarillentas. Tórax castaño. Pronoto, a veces la parte central del escudo y parte lateral del epinoto más claro; escutelo, mesopleuras y espinas siempre oscuros. Patas amarillentas con los fémures sombreados. Peciolo y postpeciolo amarillentos con los nudos oscurecidos. Gaster castaño oscuro, salvo a veces la parte anterior del primer tergito que es amarillenta.

Mandíbulas, clípeo y palpos bucales igual que en la obrera. Cabeza brillante; la escultura está más desarrollada que en las obreras, especialmente las estrías longitudinales invaden la frente y llegan hasta el occipucio, aunque muy poco marcadas en éste. Longitud cabeza/anchura: 1.04 - 1.08 - 1.15. Escapo algo más corto que en la obrera, llegando casi hasta el borde occipital. Longitud escapo/anchura cabeza: 0.81 - 0.84 - 0.88.

Pronoto invisible en vista dorsal. Longitud tórax/anchura tórax: 1.39 - 1.49 - 1.56. Escudo estriado-reticulado levemente en sentido longitudinal salvo en los lados. En la parte anterior media del mismo hay una zona lisa y brillante que desciende hasta el pronoto. Escutelo liso y brillante. Mesopleuras levemente estriadas longitudinalmente, siguiendo hasta los lados del epinoto. Cara dorsal del epinoto con algunas estrías dorsales poco marcadas. Espinas más desarrolladas que en la obrera. Índice de Buschinger: 1.35 - 1.60 - 1.80.

Peciolo más anguloso que en la obrera; en ocasiones hay una carena transversal en la unión de la cara anterior y posterior. Longitud peciolo/altura: 1.07 - 1.11 - 1.16. Postpeciolo más ancho que en la obrera. Anchura/longitud: 1.50 - 1.60 - 1.73. La escultura de ambos sigue la tendencia general de estar más marcada que en la obrera.

Alas hialinas; pterostigma y nerviaciones amarillo muy claro. Cubital muy alargada; radial cerrada, breve; discoidal en trapecio, a veces no cerrada completamente.

Gaster liso y brillante.