

Kiesenwetteri, etc. J'ai donc resuscité le sous-genre *Myrmontoma* For., qui a pour type *C. lateralis*, tandis que *Orthonotomyrmex* Ashm. a pour type *C. sericeus*.'

He points out, with other differences, that the sculpture of the tegument of *C. lateralis* is shining, whereas in *C. sericeus* it is mat, etc.

Santschi (1921) writes :—

'La division du vaste genre *Camponotus* en sous-genres devenue nécessaire ne peut se faire sans tâtonnements.'

He proposes several new subgenera and he writes concerning *Orthonotomyrmex* :—

'Je restreins ce sous-genre aux espèces de la liste qu'en donne M. Emery (1920) dont l'écaille est nodiforme et beaucoup plus convexe devant, avec un sommet toujours mousse. Au type *C. sericeus* Mayr. s'ajoutent comme espèces principales les *C. Mayri* For. *scabrinodis* Arnold, *Kiesenwetteri* Rog., *libanicus* André, *Wasmanni*, Em. et *selene* Emery. Quant aux espèces restantes de la liste de M. Emery, ci-dessus, elles ont comme caractère commun un thorax interrompu et l'écaillé plus ou moins tranchante au sommet avec la face postérieure aussi convexe que l'antérieure. Elles peuvent cependant constituer encore deux groupements sous-génériques distincts soit: 2. *Myrmisolepis* nov. s.-g. . . . ' [in which the pronotum is angular, more or less margined and depressed; etc., and] ' 3. *Myrmopelta* nov. s.-g. . . . ' [in which the pronotum is not at all angular nor margined; etc.].

Emery (1925) accepts Santschi's restriction of *Orthonotomyrmex*, *Myrmisolepis* he amends considerably, and *Myrmopelta* he splits up among a number of other subgenera. Emery's definition of *Orthonotomyrmex* is as follows :—

Espèces moyennes ou petites; dimorphisme des ouvrières médiocrement accusé.

Tête des ouvrières maxima grande, plus large que longue, tronquée derrière, avec des ocelles parfois distincts (au moins chez *C. sericeus*, F.); plus ou moins arrondie chez les petites ouvrières. . . . Epistome court, avec un lobe arrondi, quelquefois échancré au milieu.

Corselet de l'ouvrière robuste, avec une forte impression ou encoche devant l'épinothorax; celui-ci affecte différentes formes: tantôt il est marginé sur les côtés et abrupt ou bidenté en arrière (*C. sericeus*, F., *mayri*, Forel, *selene*, Emery), tantôt il est plus ou moins arrondi (*C. wasmanni*, Emery, *dofleini*, Forel); le pronotum est ordinairement arrondi, mais chez *wasmanni* il est denté aux épaules et chez *selene*, tout le dos du corselet est marginé et les épaules se prolongent en une forte dent.

Pétiote surmonté d'une proéminence nodiforme arrondie et grossièrement ponctuée-fovéolée. Tégument mat, souvent couvert d'une ponctuation rude.'

In the table for the subgenera he separates *Orthonotomyrmex* from all the following by

Ecaille basse, ayant la forme d'un noeud arrondi, ponctué grossièrement, *Orthonotomyrmex*.'

Ecaille mince ou épaisse, jamais nodiforme.'

for some 13 subgenera including *Tanaemyrmex*. In his list of the