



Chalepoxenus tramieri nov. sp. — Profil de l'ouvrière; pétioles vus de dessus, antenne, patte II.

Corps luisant, en grande partie lisse. Pubescence courte, décombante ou couchée, plus dense sur la tête, plus espacée sur le gastre, absente sur le thorax et les nœuds. Des soies dressées ou subdressées, fines et pointues sur tout le corps, les plus grandes étant longues comme le diamètre maximum du tibia III. Les pattes portent seulement la pubescence, plus dense que sur le corps mais pas de soies; scapes et antennes avec une pilosité fournie mais plus courte. Mandibules finement striées réticulées; elles présentent une courte pubescence appliquée un peu plus dense que sur les pattes et plus longues le long du bord masticateur; celui-ci a 5 dents, l'apicale étant la plus développée.

Tête d'un tiers plus longue que large, plus étroite en avant des yeux qu'en arrière de ceux-ci, les côtés restant cependant parallèles. Angles occipitaux très arrondis; pas de soies dressées sur le bord occipital. Clypéus nettement proéminent, à peine réticulé sur ses marges; aire frontale lisse. Une faible réticulation se voit entre les arrêtes frontales et s'efface en arrière, à la moitié de celles-ci; une sculpture plus forte (ponctuation avec quelques rides) orne les joues mais disparaît au niveau de l'œil, tout le front et l'occiput lisses et luisants.

Yeux grands comme le quart de la longueur de la tête et assez proéminents, se détachant bien par leur teinte noire sur le reste du corps (surtout sur le vivant). Scape dépassant le bord occipital d'environ son épaisseur; articles 2 à 6 du funicule guère plus longs que larges, le 7^e et surtout les 3 derniers formant une massue bien différenciée.

Thorax un peu plus étroit que la tête et deux fois plus long que large aux épaules. Suture promésonotale visible, suture mésoépinotale déprimée mais relativement peu enfoncée, soulignée par quelques rides. Dos luisant, à peine réticulé par places; la sculpture devient plus accentuée sur les flancs et l'épinotum qui portent de courtes rides longitudinales agrémentées d'une ponctuation plus dense. Epines bien développées, un peu incurvées, dessinant un demi-cercle avec leur intervalle basal; vues de dessus, elles sont aussi longues que celui-ci. Pétiole aussi long que haut; son nœud massif et arrondi au sommet. Il est orné d'une faible réticulation, principalement sur sa face postérieure. Le bord ventral forme une carène qui se termine en avant par une dent lobiforme caractéristique.

Post-pétiole un plus d'une fois et demi plus large que long vu de dessus et aussi haut que le pétiole vu de profil. Ventralement il présente une pointe fine et aiguë, longue comme environ le 1/4 de la hauteur du nœud. Le dessus du post-pétiole est à peu près luisant mais les côtés et l'arrière sont relativement réticulés avec une ou deux rides en long.