

peine éclairci sur les pédoncules pétiolaires et les tarsi. Gaster noir. Pilosité blanche, hérissée, ayant la même disposition que chez *A. praedo*.

Mandibules puissantes, avec la dentition habituelle. Tête allongée caractéristique du groupe, les angles occipitaux quasiment plats. Yeux et antennes comme chez *praedo*, avec les articles du funicule en moyenne 2,5 fois plus longs qu'épais.

Tout le tégument, de la tête aux pétioles est finement et densément réticulé. Des rides très ténues s'étendent du clypeus à l'occiput ; elles sont cependant irrégulières et discontinues, formant par places un réseau de mailles plus ou moins lâches. Sur le pronotum et une bonne partie du mesonotum, elles deviennent davantage distinctes, formant toujours des mailles parfois incomplètes ; elles se renforcent encore un peu plus sur l'épinothum d'où elles redescendent sur les flancs. Le sillon épinothum est bien creusé. Les épines ne sont guère plus longues que leur intervalle basal vu de dessus.

Nœuds sans rides distinctes. En vue de profil, le nœud pétiolaire montre une face antérieure abrupte sur le pédoncule, nettement plus brève que la face postérieure ; l'angle entre les deux, bien qu'émoussé, est d'environ 95°. Au postpétiole, la face avant est plus longue que l'arrière et le sommet plus arrondi.

Gaster finement moiré en long, sans stries transversales autour de l'articulation avec le postpétiole. Elles s'atténuent dès le premier quart basal du tergite et disparaissent un peu en arrière de la moitié du segment.

Pattes grêles, les fémurs un peu renflés ; P III est en moyenne longue comme 1,25 fois le corps.

Larve du dernier stade : Environ 3,5 mm ; pilosité fauve clair, longue de 0,10-0,15 mm, simple, avec très peu de poils bifides.

DESCRIPTION DE LA REINE

Longueur du corps : 8,6-9,2 mm. Même pilosité et colorations que l'ouvrière, mais la tête est plus nettement rembrunie autour des yeux et entre les ocelles ; le thorax porte de larges zones presque noires sur le pronotum et le pourtour du scutum.

La tête est rétrécie en arrière, mais de façon moindre que chez l'ouvrière ; les yeux sont plus développés ; ocelles petits, la distance qui sépare les postérieurs faisant plus de trois fois et demie le diamètre de l'antérieur.

Le tégument est finement réticulé comme chez l'ouvrière mais avec des rides plus nombreuses et aussi plus fortes ; elles sont assez nettes, à peu près droites entre les antennes et plus discontinues sur les joues ; sur le front et les tempes, elles s'anastomosent pour constituer un réseau de mailles de dimensions variables. Pronotum ridé en travers ; sur le scutum, des rides divergentes partent en s'écartant des notauli, lesquels sont bien distincts. Scutellum garni de rides divergentes en bouquet ; l'épinothum porte de fortes rides transversales qui retombent en éventail ou en arc de cercle sur les côtés ; les épisternes sont également ornés de rides assez fines qui s'étendent obliquement et en long.

Le thorax est un peu plus large que la tête. Scutum et scutellum sont bien développés tandis que la face dorsale de l'épinothum tombe obliquement vers l'arrière, sans marquer d'angle au niveau des épines. Celles-ci sont fortes, recourbées vers l'intérieur et plus courtes que leur intervalle basal.

Nœuds ridés en petites mailles serrées et confuses ; celui du pétiole présente une face antérieure relevée, un sommet subanguleux d'à peu près 90° et une face postérieure en courbe oblique. Le postpétiole est arrondi, avec une face avant convexe ; vu de dessus il apparaît piriforme, avec son maximum de largeur au 1/5 postérieur.

Gaster presque deux fois plus large que le thorax chez la reine féconde. La striation s'étend sur les 4/5 du premier tergite bien que s'atténuant d'avant en arrière ; elle présente une série de stries concentriques autour de l'articulation avec le postpétiole et une bande médiane de stries longitudinales bordée de dessins en empreinte digitale.

Patte III aussi longue que le corps. Aile antérieure grande comme les 2/3 de celui-ci et ayant conservé la nervation habituelle (1 discoïdale et 2 cubitales).