



Figure 2 : *Aphaenogaster wilsoni* n. sp., antenne du mâle et genitalia ; — p : plaque sous génitale ; q : valve externe ; r : valve moyenne ; s : valve interne ; t : penicilli.

Aux pétioles, le pédoncule est nettement plus allongé que le nœud lequel prend des formes variées, arrondies ou grossièrement triangulaires mais restant toujours bas. Postpétiole peu élevé lui aussi, arrondi de profil et piriforme vu de dessus, près de 2 fois plus étroit à son articulation avec le pétiole qu'à son maximum de largeur (situé au tiers postérieur). Pétiole et postpétiole sont finement réticulés, avec quelques courtes rides longitudinales sur les nœuds.

Gastre lisse, mis à part une réticulation plus ou moins bien imprimée au niveau de l'articulation avec le postpétiole.

Pattes longues et grêles, avec les fémurs incurvés, surtout à la III qui est longue comme 1,4 fois le corps. Ailes claires, nervures jaunes ; l'antérieure est aussi longue que le corps.

*Description des pièces génitales* (les termes entre parenthèses sont ceux proposés par FRANCŒUR *et al.*, 1985, et que nous adopterons désormais) :

*Genitalia* rétractiles, brunes, longues de 0,78-0,86 mm en comptant la lame annulaire. *Plaque sous-génitale* largement pentagonale, plus ou moins échancrée au sommet qui porte une soixantaine de soies assez longues. *Penicilli (socii)* deux fois plus longs que larges, portant des soies presque aussi longues que l'appendice et situées sur le bord interne et le sommet. *Valve externe (paramères)* avec environ quarante soies à l'apex. *Valve moyenne* relativement peu découpée ; le crochet de la volselle (digitus) est épais, rectangulaire et son bord inférieur (antrum) à peine échancré. L'angle antéro-inférieur (calx) est presque effacé ; une dizaine de petites soies garnissent le bord ventral. Lacinia (cuspis) un peu