

côté gauche (l'animal étant vu de dessus), comme dans le « type c » (*idem*). Aucun individu de la série ne présente de stries basales transversales.

Pattes III longues comme 1,2 fois le corps, leurs tibias à peine plus grands que les scapes.

Larve du dernier stade : 3,8-4,3 mm (étendue). Jaunâtre, garnie de poils fauves de 0,10-0,16 mm, dressés et un peu arqués ; la plupart sont courtement bifides et quelques-uns le sont plus longuement (fig. 2, F).




FIG. 1. — *Aphaenogaster atlantis* Santschi : profil de l'ouvrière et de la reine; échelle = 1 mm.

Description de la reine (inédite) (fig.1)

Longueur du corps : 8,5-9,2 mm. Coloration semblable à celle de l'ouvrière ainsi que la pilosité (plus longue sur les pétiotes : 0,20 mm).

Les rides s'étendent sur toute la tête, formant des mailles autour des yeux, des ocelles et s'effaçant vers l'occiput ; elles restent assez fines et peu distinctes de la réticulation, sauf entre les arêtes antennaires où elles deviennent plus fortes. Antennes comme chez les ouvrières mais les yeux sont plus grands. Thorax confusément réticulé-ridé sur le dos, plus franchement ridé en long sur les flancs, tandis que l'épinotum porte une série de rides transversales, assez serrées et un peu sinueuses, qui se continuent jusqu'entre les épines, puis la face déclive devient lisse. Vu de profil, l'épinotum fait une pente oblique, presque sans angle au niveau des épines, lesquelles sont plus brèves que leur intervalle basal et un peu incurvées vers l'intérieur.

Nœuds rugueux, avec des rides peu marquées mais parfois plus fortes sur le postpétiole, chez certains individus. De profil, le nœud pétiole est plus ou moins étroit et élevé, anguleux