

Monomorium minutum Mayr. - a) Faenza (LOMBARDINI, 1926), Forlì (C), Madonna del Lago (M), Pineta di Classe (M), Pineta di Cervia (M), Romiti (M), S. Alberto (C), Saline di Cervia (M), S. Varano (M).

Solenopsis fugax Latr. - (3) a) Dovia (F), Faenza (LOMBARDINI, 1926), Forlì (C), Farazzano (C), Ladino (F), Meldola (F), Pineta di Ravenna (F), Ravaldino (M), S. Varano (F), Virano (F); b) Bertinoro (F), Caminate (F), Cusercoli (F), Fognano (A. Martelli leg.) (C), Portico di Romagna (F), S. Savino (F); c) Balze (C).
Alati in Agosto-Ottobre.

Myrmecina graminicola Latr. - a) Bosco di Ladino (C, F), Bosco di Scardavilla (F), Dovadola (C), Farazzano (C), Forlì (C), S. Lorenzo in Noceto (F), Virano (F), Vecchiazano (C); b) Bertinoro (F), Borletto (C), Colle delle Forche (F), S. Marino (C).
Alati in Agosto.

Leptothorax rottenbergi Em. - a) Bosco di Ladino (F), Bosco di Scardavilla (M), Pineta di Cervia (M), Pineta di S. Vitale (F), Vecchiazano (C); b) Caminate (M), Spinello (M); c) Campigna (M), M. Aiola (M), Sasso di Simone (C), Senatello (C).
Alati in Luglio-Ottobre.

Leptothorax clypeatus Mayr. - a) Pineta di S. Vitale (C).

Leptothorax unifasciatus Latr. - a) Bosco di Scardavilla (M), Forlì (C), Grisignano (F), Meldola (M), S. Agostino (F), S. Lorenzo in Noceto (F), Virano (F); b) S. Paolo in Aquiliano (F).

Leptothorax interruptus Sch. - a) Farazzano (C).

Leptothorax nylanderii Foerst. - a) Bosco di Ladino (C), Dovadola (C), Forlì (C), Pineta di S. Vitale (C), Scardavilla (F), Vecchiazano (C); b) Alfero (C), Bertinoro (F), Cusercoli (F), Monte Colombo (C), S. Marino (C); c) Campigna (C), M. Carzolano (C), Poggio Scali (C).

Leptothorax affinis ssp. **italicus** Cons. n. ssp. (= *L. affinis* ssp. *rabaudi* Menoz. et Finzi, nec Bondr.). L'operaia di questa Formica si differenzia dalla ssp. *rabaudi* Bondr. per il profilo del torace meno diritto, per il piano posteriore del peziolo meno rettilineo, per la fronte ed il resto del capo molto lucidi e per la clava distintamente imbrunita.

Differisce dal tipico *L. affinis* Mayr (secondo un confronto fatto dal Dott. A. Staercke con dei tipi di Dresda, provenienti dal Viehmeyer) per le spine meno diritte e più acute (4).

a) Dovadola (S), Foce del Reno (C), S. Ruffillo di Dovadola (S);
c) Balze (C), Campigna (C), Poggio Scali (C).

(3) E' possibile che gli esemplari determinati come *S. fugax* appartengano a qualcuna delle specie recentemente descritte di Francia dal BERNARD (Ann. Soc. Entom. France, CXV, 1949, pp. 4-16, fig. 2) o a specie nuove. Sarà opportuno uno studio accurato basato su un materiale più abbondante e completo di quello ora a nostra disposizione.

(4) Questa sottospecie sarà studiata più accuratamente, inquadrandola in uno studio di tutte le forme italiane del Genere.