

montagna di Aggius: prima metà di giugno.

Odynerus Reaumurii, D u f. — Rinvenuto nelle campagne di Tissi: seconda metà di maggio.

Alastor atropos, L e p. — Raccolto nelle adiacenze di Alghero: seconda metà di maggio.

Polistes gallica, L i n. — Diffusa per tutta l'isola e più o meno comune.

Vespa crabro, L i n. — Diffusa e comune per tutta l'isola.

— **germanica**, F a b. — Comune ovunque.

Specie indeterminate 6.

Formicidae

Camponotus pubescens, F a b.

— **lateralis**, O l i v.

Lasius niger, L i n.

Tapinoma nigerrimum, N y l. — Raccolto nelle vicinanze di Oschiri.

Aphaenogaster barbara, L i n.

— **testaceopilosa**, L u c.

— **subterranea**, L a t r.

Myrmica scabrinodis, N y l. — Trovata molto abbondante tra le radici delle piante presso le sponde dello Stagno di Cagliari: aprile.

Pheidole pallidula, N y l.

Specie indeterminata 1.

Apidae

Colletes succincta, L i n. — Raccolta nelle adiacenze di Tempio: giugno.

Hylaeus variegatus, F a b. — Diffuso per molte parti dell'isola: maggio e giugno.

— **signatus**, P a n z. — Trovato abbondante nelle vicinanze di Alghero.

Sphecodes fuscipennis, G e r m. — Raccolta in vari luoghi: maggio.

— **ephippius**, L i n. — Anche questa trovasi molto diffusa.

Halictus quadricinctus, L a t r. — Raccolto in vari luoghi, in maggio e giugno.

— **vulpinus**, F a b. — Trovato abbondante presso Oristano e San Lussurgio: maggio.

— **vestitus**, L e p. — Raccolto nelle campagne di Orri negli ultimi giorni di aprile.

— **rubicundus**, C h r i s. — Rinvenuto nelle vicinanze di Alghero: maggio.

— **lucidulus**, S c h. — Trovato nel Campidano di Cagliari: giugno.

— **cylindricus**, F a b. — Raccolto nelle vicinanze di Oliena: giugno.

Halictus albipes, F a b. — Trovato nelle adiacenze di Cagliari.

— **aureus**, K r i e c b. — Raccolto presso Cagliari: aprile.

— **flavipes**, F a b. (*A. subaurata*, R o s s.) — Rinvenuto nel Campidano di Cagliari: giugno.

Nomioides minutissimus, R o s s. (*An. pulchella*, J u r.) — Trovata in diversi luoghi in maggio e giugno.

Andrena sardoa, L e p. — Ne abbiamo rinvenuto un individuo presso San Lussurgio: maggio.

— **holomelana**, L e p. — Trovata molto abbondante nelle vicinanze di Cagliari nella seconda metà di aprile: osservata ancora in prosieguo presso Sassari, nell'isola dell'Asinara, ed anche su'monti del Limbara.

— **collaris**, L e p. — Rinvenuta presso Iglesias (principio di maggio) e Nuoro (seconda metà di giugno).

— **thoracica**, F a b. — Raccolta presso Tempio e sui monti del Limbara: giugno.

— **flessae**, P a n z. — Diffusa per molte parti dell'isola dalla metà di aprile in poi: trovata a Cagliari, Pula, S. Lussurgio, Sassari, Osilo.

— **umbellatarum**, G r. — Raccolta presso Domusnovas, Oristano, Alghero: maggio.

— **denticulata**, K i r b. — Diffusa per quasi tutta l'isola, dalla metà di aprile in poi: trovata a Cagliari, Pula, Oristano, Sassari, Ozieri.

— **mactae**, L e p. — Frequente presso Cagliari, Pula, Milis.

Panurgus canescens, L a t r. — Raccolto presso Domusnovas, Tissi ed Aggius: aprile, maggio e giugno.

Osmia dorcas, n o b. — Raccolta nelle adiacenze di Cagliari, Siliqua, Oristano e Milis: aprile e maggio.

— **tricornis**, L a t r. — Trovata presso Cagliari in aprile, e molto abbondante presso Domusnovas ne'primi giorni di maggio.

— **Latreillii**, S p i n. — Raccolta presso Domusnovas, Alghero, nell'isola dell'Asinara, in maggio; nelle vicinanze di Tempio in giugno.

— **cephalotes**, E r i c. — Trovata la femmina non rara nelle adiacenze di Alghero in maggio: qualche maschio raccolto a Orri in aprile.