

1839, KIELCZEWSKI, NAWROT, WIŚNIEWSKI 1970, NAWROT, WIŚNIEWSKI 1970; Sudety Wschodnie: PISARSKI 1961, STAWARSKI 1966.

Nowe stanowiska. Sudety Zachodnie: Pilichowice.

Występowanie. Stanowiska tego gatunku spotyka się w całych Sudetach tylko w piętrze pogórza. Występuje na terenach tak kamienistych, jak i piaszczystych, suchych i silnie nasłonecznionych.

### 21. *Camponotus fallax* NYLANDER

Rozmieszczenie. Gatunek znany z Sudetów tylko z jednego stanowiska: Świebodzice (PISARSKI 1961).

### 22. *Lasius (Dendrolasius) fuliginosus* LATREILLE

Rozmieszczenie. Sudety Środkowe: SCHILLING 1839.

Nowe stanowiska. Sudety Zachodnie: Pilichowice.

### 23. *Lasius (Lasius) niger* (LINNAEUS)

Rozmieszczenie. Sudety Zachodnie: SCHOLTZ 1911, BEGDON 1958; Sudety Środkowe: STAWARSKI 1966; Sudety Wschodnie: SCHILLING 1830, STAWARSKI 1966.

Nowe stanowiska. Sudety Zachodnie: Hala Izerska, Krogulec, Pilichowice, Radomierz, Wojcieszów; Sudety Wschodnie: Bliszczyce.

Występowanie. Gatunek ten spotykany jest na terenie całych Sudetów. Występuje w piętrze pogórza, regła dolnego i regła górnego w środowiskach zarówno suchych, jak i wilgotnych. Na łąkach buduje gniazda z kopcami ziemnymi nieraz przerośniętymi trawą a na porębach lub skrajach lasów często wykorzystuje zwalone, spróchniałe pnie.

### 24. *Lasius (Lasius) brunneus* (LATREILLE)

Rozmieszczenie. Sudety Środkowe: SCHILLING 1839.

Nowe stanowiska. Sudety Zachodnie: Rudy Grzbiet, Sobieszów – góra Chojnik; Sudety Środkowe: Świebodzice.

Występowanie. *L. brunneus* występuje w Sudetach w piętrze pogórza. Znalaziono tylko dwa gniazda w cienistych i wilgotnych lasach mieszanych, pod korą pni.

### 25. *Lasius (Cautolasius) flavus* (FABRICIUS)

Rozmieszczenie. Sudety Zachodnie: LETZNER 1887, STAWARSKI 1966; Sudety Środkowe: SCHILLING 1839, SCHOLTZ 1911; Sudety Wschodnie: STAWARSKI 1966.

Nowe stanowiska. Sudety Zachodnie: Cieplice, Jelenia Góra, Pilichowice, Radomierz,