

Rudy Grzbiet, Stóg Izerski, Świeradów Zdrój, Wojcieszów; Sudety Środkowe: Ludwikowice Kłodzkie, Polanica, Świebodzice, Zieleniec; Sudety Wschodnie: Bliszczycze.

Występowanie. Gatunek znany z całych Sudetów. Występuje w piętrze pogórza, regla dolnego i regla górnego. Buduje gniazda zarówno z kopcami ziemnymi na łąkach w pobliżu lasów, jak i pod kamieniami i w kępach mechów w miejscach suchych i na tarasach potoków. Występuje także na terenach wapiennych porośniętych roślinnością kserofilną.

26. *Lasius (Chtonolasius) umbratus* (NYLANDER)

Rozmieszczenie. Gatunek znany tylko z dwóch stanowisk na obszarze Sudetów Środkowych: Międzygórze i Zieleniec (STAWARSKI 1966).

27. *Lasius (Chtonolasius) mixtus* (NYLANDER)

Nowe stanowiska. Gatunek znaleziony tylko w Sudetach Wschodnich w Bliszczycach.

28. *Formica (Serviformica) fusca* LINNAEUS

Rozmieszczenie. Sudety Zachodnie: DLUSSKY, PISARSKI 1971, BEGDON 1958, STAWARSKI 1966; Sudety Środkowe: SCHILLING 1839, DLUSSKY, PISARSKI 1971; Sudety Wschodnie: STAWARSKI 1966.

Nowe stanowiska. Sudety Wschodnie: Bliszczycze.

Występowanie. Gatunek spotykany na terenie całych Sudetów w piętrze pogórza. Zasiedla środowiska wilgotne, suche a nawet bardzo suche. Gniazda buduje w ziemi, pod kamieniami, pod korą zwalonych pni na łąkach i na skrajach lasów.

29. *Formica (Serviformica) lemani* BONDROIT

Rozmieszczenie. Sudety Zachodnie: DLUSSKY, PISARSKI 1971; Sudety Środkowe: STAWARSKI 1966, DLUSSKY, PISARSKI 1971; Sudety Wschodnie: STAWARSKI 1966.

Nowe stanowiska. Sudety Środkowe: Łądek Zdrój, Polanica Zdrój, Zieleniec.

Występowanie. *F. lemani* występuje w całych Sudetach na terenach otwartych w piętrach regla dolnego i górnego. Zamieszkuje suche i wilgotne polany śródleśne oraz torfowiska. Gniazda buduje pod kamieniami, w spróchniałych pniach, w kępach mechu i traw.

30. *Formica (Serviformica) picea* NYLANDER

Rozmieszczenie. Sudety Środkowe: HARNISCH 1924, PAX 1937, STAWARSKI 1961, 1966.