

31. *Formica (Serviformica) rufibarbis* FABRICIUS

Rozmieszczenie. Sudety Środkowe: STAWARSKI 1966; Sudety Wschodnie: STAWARSKI 1966.

32. *Formica (Serviformica) cunicularia* LATREILLE

Rozmieszczenie. Sudety Zachodnie: DLUSSKY, PISARSKI 1971; Sudety Środkowe: DLUSSKY, PISARSKI 1971; Sudety Wschodnie: DLUSSKY, PISARSKI 1971.
Nowe stanowiska. Sudety Środkowe: Świebodzice.

Występowanie. *F. cunicularia* występuje niezbyt licznie w całych Sudetach w piętrze pogórza. Gniazda buduje w ziemi na terenach bardzo wilgotnych i cienistych.

33. *Formica (Formica) truncorum* FABRICIUS

Rozmieszczenie. Sudety Zachodnie: DLUSSKY, PISARSKI 1971; Sudety Środkowe: DLUSSKY, PISARSKI 1971; Sudety Wschodnie: DLUSSKY, PISARSKI 1971.

Występowanie. Gatunek zamieszkujący całe Sudety w piętrach pogórza oraz dolnego i górnego regła. Występuje na torfowiskach i terenach wilgotnych. Buduje gniazda z kopcem, w kępach mechów przy spróchniałych drzewach lub pod korą zwalonych pni.

34. *Formica (Formica) pratensis* RETZIUS

Rozmieszczenie. Sudety Zachodnie: SCHOLTZ 1911, DLUSSKY, PISARSKI 1971; Sudety Wschodnie: STAWARSKI 1966, WIŚNIEWSKI 1970, DLUSSKY, PISARSKI 1971.
Nowe stanowiska. Sudety Wschodnie: Głubczyce.

Występowanie. Gatunek niezbyt licznie występujący w Sudetach, tylko w piętrze pogórza. Zamieszkuje tereny suche, zarówno słoneczne jak i cieniste. Buduje gniazda z kopcami z igieł świerkowych i szczątków organicznych.

35. *Formica (Formica) lugubris* ZETTERSTEDT

Rozmieszczenie. Gatunek wykazany z Sudetów tylko z jednego stanowiska: Zieloniec (STAWARSKI 1966).

36. *Formica (Formica) aquilonia* YARROW

Rozmieszczenie. Gatunek wykazany z Sudetów tylko z jednego stanowiska: Zieloniec (STAWARSKI 1966).

37. *Formica (Formica) rufa* LINNAEUS

Rozmieszczenie. Sudety Zachodnie: SCHILLING 1839, SCHOLTZ 1911, BURZYŃSKI