

ką liczbą gatunków borealno-alpejskich — 5, wyższą niż w Karpatach (3–4 gatunki). Procentowy udział innych elementów zoogeograficznych w mirmekofaunie Sudetów nie wykazuje istotnych różnic w porównaniu ze składem procentowym mirmekofauny Karpat Zachodnich (tabela 2).

Instytut Zoologiczny PAN  
Warszawa, Wilcza 64

#### PIŚMIENNICTWO

- BEGDON J. 1958. Nowe stanowiska kilku interesujących gatunków *Formicoidea* w Polsce. Ann. UMCS, Lublin, Sect. C, **13**: 85–93.
- BURZYŃSKI J. 1969. Mrówka rudnica i mrówka śmawa (*Formica rufa* L. i *Formica polyctena* FÖRST.), ich liczebność i rozmieszczenie w lasach Polski. Sylwan, Warszawa, **113**, 12: 65–71, 2 ff., 1 t.
- DLUSSKY G. M., PISARSKI B. 1971. Rewizja polskich gatunków mrówek (*Hymenoptera: Formicidae*) z rodzaju *Formica* L. Fragm. faun., Warszawa, **16**: 145–224, 199 ff.
- HARNISCH O. 1924. Studien zur Ökologie der Moorfauna. Biol. Zbl., Leipzig, **44**: 110–127.
- KIEŁCZEWSKI B., NAWROT J., WIŚNIEWSKI J. 1970. Roztocze występujące na gmachówce (*Camponotus* MAYR; *Hymenoptera, Formicidae*) i w jej gniazdach. Pr. Kom. Nauk roln. i leśn. Pozn. TPN, Poznań, **30**: 17–26.
- LENCEWICZ S., KONDRACKI J. 1959. Geografia fizyczna Polski. Warszawa, 486 pp.
- LETZNER K. 1887. Über Ameisen-Schwärme. Jber. schles. Ges. vaterl. Cultur, Breslau, **64**: 227.
- NAWROT J., WIŚNIEWSKI J. 1970. Owady występujące w mrowiskach *Camponotus* MAYR (*Hym. Formicidae*). Pr. Kom. Nauk roln. i leśn. Pozn. TPN., Poznań, **30**: 225–237.
- PAX F. 1937. Die Moorfauna des Glatzer Schneeberges. 2. Allgemeine Charakteristik der Hochmoore. Beitr. Biol. Glatzer Schneeberges, Breslau, **3**: 237–266, ff. 84–101.
- PISARSKI B. 1961. Badania nad krajowymi gatunkami z rodzaju *Camponotus* MAYR (*Hymenoptera, Formicidae*). Ann. zool., Warszawa, 19: 147–208, 122 ff.
- SADIL J. V. 1951. A revision of the Czechoslovak forms of the genus *Myrmica* LATR. (*Hym.*). Sborn. entom. Odd. nár. Mus., Praha, **27**: 233–278.
- SAROSIEK J., SEMBRAT K., WIKTOR A. 1967. Sudety. Warszawa, 223 pp.
- SCHILLING [S.]. 1830. Aus der Ordnung der *Hymenoptera*. Uebers. Arb. schles. Ges. vaterl. Cultur, Breslau, **1829**: 54–55.
- SCHILLING [S.]. 1839. Bemerkungen über die in Schlesien und Grafschaft Glatz vorgefundenen Arten der Amaisen. Uebers. Arb. Veränder. schles. Ges. vaterl. Cultur, Breslau, **1838**: 51–56.
- SCHOLTZ E. J. R. 1911. Papierwespen- und Ameisennester aus dem Heidelbergberge. Schlesien, Kattowitz, **5**: 105–110, 6 ff.
- SCHOLTZ E. J. R. 1924. *Formica exsecta* var. *sudetica* nov. var. Neue Beitr. system. Insektenk., Berlin, **3**: 48.
- STAWARSKI I. 1961. Nowe stanowiska rzadkich gatunków mrówek (*Hymenoptera, Formicidae*). Pol. Pismo ent., Wrocław, **31**: 135–138.
- STAWARSKI I. 1966. Typy gniazd mrówek i ich związki z siedliskiem na terenach południowej Polski. Zesz. przyr. Opol. TPN, Opole, **6**: 93–157.