

Strongylognathus huberi subsp. **cecconii** Em.

Strongylognathus huberi rehbinderi var. *cecconii* EMERY, 1908, in « CECCONI: Contributo alla fauna delle isole Tremiti », Boll. Mus. Zool. An. Comp. Univ. Torino, XXIII, 583, pag. 24, ♀ (descrizione originale).

Strongylognathus huberi rehbinderi var. *cecconii* EMERY, 1909, Deutsch. Ent. Zeitschr., VI, pag. 711.

Strongylognathus huberi cecconii EMERY, 1916, Bull. Soc. Ent. Ital., XLVII, pag. 199.

Località classica: Isole Tremiti.

Geonemia: Isole Tremiti, Gargano.




Fig. I

Strongylognathus huberi cecconii Em.

1. Mandibola della ♀ vista dal ventre. — 2. Capo e mandibola della ♀ visti dal dorso. — 3. Antenna della ♀.

Anche di questa specie nota solo della località classica (S. Nicola! Caprara) ho raccolto numerose operaie e femmine in diverse località del Gargano che qui elenco: Pèschici, 12-X-1961, un nido assai popoloso misto di *Tetramorium caespitum* L. e *Strongylognathus*, nel quale, mentre le operaie della specie dulotica erano in grandissima minoranza numerica rispetto all'ospite, le femmine *Strongylognathus* costituivano all'incirca il 50% della popolazione totale; Manfredonia, 10-X-1961, un altro nido in condizioni del