

(V. KOGOI leg.) e ne ho personalmente raccolte numerose operaie a Valdobbiadene (Treviso) nel 1959-60 dove è frequentissima in luoghi umidi e riparati. Un'altra operaia è stata da me raccolta a Verona (16-V-1959) in un'aula al primo piano del vecchio liceo Maffei. È quasi certo però che la specie sia stata importata a Verona ad opera dell'uomo, probabilmente con la legna da ardere; infatti, nonostante le mie frequenti escursioni nella zona, non mi è stato più possibile raccoglierla.

* * *

Sulla base dei reperti sopra riportati si può, in sintesi, confermare la presenza in Italia di due specie di *Ponera* che da oltre mezzo secolo non venivano più raccolte nella nostra regione, segnalare una specie nuova per l'Italia (*Strongylognathus huberi* For.) e puntualizzare la corologia di alcune specie a probabile diffusione transadriatica o periadriatica, aspetto della mirmecologia mediterranea sinora assai poco studiato. La proposta di un nuovo sinonimo di *Strongylognathus huberi* e la descrizione (inedita) della femmina della subsp. *ceconii* contribuiscono, in parte, a chiarire la posizione sistematica del complesso.

RIASSUNTO

L'autore tratta l'interessante corologia di otto specie di formiche appartenenti alla fauna d'Italia e di qualcuna di esse chiarisce anche la posizione sistematica.

- 1) *Ponera ragusai* Em. è stata raccolta in una grotta presso Pachino (Sicilia).
- 2) *Ponera abeillei* André, a Sirolo (Ancona) e se ne discute la geonemia.
- 3) *Aphaenogaster ovaticeps mülleriana* Wolf, è resa nota della città di Gorizia e si osserva come questa forma sembri abitare di preferenza in prossimità dei centri abitati.
- 4) *Leptothorax massiliensis* Bondr. dato di un'altra stazione dell'Adriatico occidentale.
- 5) *Strongylognathus testaceus* Sch. viene segnalato in altre tre località dell'arco alpino (Settimo pr. Verona, Paderno prov. Treviso, e Baselga pr. Trento) ed in una dell'Italia meridionale (Bosco d'Umbra in Gargano).
- 6) *Strongylognathus huberi* For. è stato raccolto a Settimo (Verona). Si propone la nuova sinonimia: *S. huberi* For. = *S. huberi* var. *gallica* Em.
- 7) *Strongylognathus huberi ceconii* Em. viene segnalato in tre diverse località del Gargano (S. Marco in Lamis, Pèschici e Manfredonia) e se ne descrive per la prima volta la femmina.
- 8) *Prenolepis nitens* Mayr, è data di Divaca (Lubiana), Valdobbiadene (Treviso), e, con riserva sull'autenticità del dato, della città di Verona.