

WILSON E. O., 1955. *A Monographic Revision of the Ant Genus Lasius*. Bull. Mus. Comp. Zool., 113, pp. 3-201, 17 figg., 2 tavv.

ZIMMERMANN S., 1934. *Beitrag zur Kenntnis der Ameisenfauna Süddalmatiens*. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, LXXXIV, pp. 5-65.

Nota: In questo elenco bibliografico ho riunito oltre ai lavori di diversa natura che mi sono serviti alla compilazione della presente nota e via via citati nel testo, anche un elenco completo di tutte le faunule e gli elenchi regionali a me noti pubblicati a partire dal 1869, data del primo lavoro di CARLO EMERY, riguardanti la fauna appenninica peninsulare. Sono esclusi tutti i lavori prevalentemente sistematici pur se includono segnalazioni interessanti per la regione in esame, le piccole isole e la Puglia che verrà da me tra breve trattata in veste monografica.

RIASSUNTO

L'Autore riferisce dei risultati mirmecologici delle campagne del Professor Sandro Ruffo e dei suoi collaboratori nella regione appenninica. Vengono complessivamente segnalate di diverse località quarantatré forme di cui una (*Monomorium subopacum* ssp. *italica* C.B.U.) nuova per la Scienza. L'areale di questa razza rappresenta la propaggine più settentrionale di quello del *M. subopacum*, specie a larga distribuzione sud mediterranea che non era ancora nota della penisola italiana.

Oltre ad alcune segnalazioni di un certo interesse chorologico, vengono proposti i seguenti mutamenti nomenclaturali: *Messor minor* ssp. *minor* var. *calabrica* SANT. = *Messor minor* ssp. *calabrica* C.B.U. e *Formica exsecta* var. *etrusca* EM. = *Formica exsecta* ssp. *etrusca* BONDR.

RÉSUMÉ

L'Auteur donne les résultats myrmécologiques des campagnes du Prof. Sandro Ruffo et de ses collaborateurs dans la région des Appennins. On signale de plusieurs localités un total de quarante trois formes dont une (*Monomorium subopacum* ssp. *italica* C.B.U.) est nouvelle pour la Science. L'emplacement de cette race représente la ramifications la plus septentrionale de *M. subopacum*, espèce à grande distribution sud-méditerranéenne qui n'était pas encore connue de la presqu'île italienne.

Outre quelques données d'un certain intérêt chorologique, on propose les changements suivants dans la nomenclature: *Messor minor* ssp. *minor* var. *calabrica* SANT. = *Messor minor* ssp. *calabrica* C.B.U. et *Formica exsecta* var. *etrusca* EM. = *Formica exsecta* ssp. *etrusca* BONDR.