

En somme, les 3 castes diffèrent par leur ponctuation, entre *O. esterelana* et *O. sordidula* : ces détails de sculpture ne suffiraient pas à établir une espèce, mais s'ajoutent aux autres arguments, surtout de proportions biométriques, pour séparer les deux formes. Celui des sillons de Mayr est particulièrement solide.

### BIBLIOGRAPHIE

Aucun myrmécologue européen, à notre connaissance, n'a comparé biométriquement les *Orthocrema* locaux. On sera donc amené à citer seulement la monographie d'EMERY, et quelques-uns de nos propres travaux :

EMERY (C.), 1921. — Myrmicinae, dans le *Genera Insectorum* de WYSTMAN, fasc. 137.

BERNARD (F.), 1967. — Les Fourmis d'Europe occidentale et septentrionale. Masson, Paris, 411 p., 450 fig.

— 1973. — Tendances calcicoles ou silicicoles chez les Fourmis méditerranéennes. (*Proceedings VII<sup>e</sup> Congress U.S.S.I.*, London, pp. 16-19.)

1978. — Ecologie des Fourmis de l'Estérel (*Bull. Muséum de Nice*, 56 p., s.p.).

(Université de Nice, Ecologie animale terrestre, Parc Valrose, 06000 Nice).

---

### Deux nouveaux Emésinés des îles Galapagos

[HEM. REDUVIIDAE]

par André VILLIERS

Bien que fréquentées par de nombreux naturalistes, les îles Galapagos n'ont livré qu'un très petit nombre d'Emésinés. En fait, il n'en a été récolté jusqu'ici que 7 espèces : *Ploiaria macrophthalma* (Dohrn), espèce cosmopolite et 6 espèces de *Ghinallelia* dont deux sont décrites ici ; ces 6 espèces se rencontrent sur 6 îles ; il est donc vraisemblable que, lorsque les 17 îles de l'archipel auront pu être explorées, le nombre des *Ghinallelia* se trouvera substantiellement augmenté.

***Ghinallelia vagvolgyianus* n. sp.** (fig. 1 à 8). — Longueur : 11 mm. — Tête jaunâtre, ses côtés avec une bande brune, large en avant des yeux, plus étroite en arrière, où elle remonte sur le dessus de la tête ; celui-ci avec deux vagues bandes brunes sur le lobe antérieur ; rostre testacé. Antennes brunes, le premier article testacé à la base, le second avec un vague anneau jaunâtre près de la base. Thorax jaunâtre avec ses côtés et deux bandes discales, peu nettes sur le pronotum, brunâtres. Hanches antérieures testacées, assombries à l'apex ; fémurs antérieurs testacés avec trois larges anneaux brunâtres ; tibias antérieurs testacés, assombris à la base et à l'apex ; tarse antérieur brun, parfois testacé à la base. Fémurs intermédiaires avec cinq anneaux testacés (le premier à la base) et cinq anneaux bruns (le dernier, étroit, à l'apex) ; tibias intermédiaires et postérieurs testacés, avec la base, l'apex et un anneau près de la base bruns.