

las a um lugar mais seguro. O secretario de agricultura daquelle Estado tomou medidas energicas no sentido de circumscrever a praga, encarregando o Rev. D. Pickel com a organisação de uma commissão de estudo e debellação do parasita.

A formiga parahybense que me foi enviada para classificaçãõ, pertence ao genero *Acropyga* Roger subg. *Rhizomyrma* Forel o qual até hoje contava tres representantes no Brasil: *A. decedens* Mayr em S. Catharina (Verh. zool.-bot. Ges. Wien vol. 37, 1887, p. 521), *A. goeldii* Forel no Rio de Janeiro (Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 348 nota) e *A. pachycera* Emery no Matto Grosso (Bull. Soc. Ent. Ital. vol. 37, 1905, p. 182). Outras especies americanas vivem na Colombia, no Mexico, em Haiti, na Ilha S. Vicente, etc.

Examinando o material de Parahyba e consultando a litteratura respectiva, logo me pareceu tratar-se de uma especie nova. Para andar mais seguro, enviei alguns exemplares ao Snr. Dr. C. Menozzi a quem deixo tambem neste lugar assignalados os meus sinceros agradecimentos pela gentileza e desinteresse com que sempre attendeu as minhas consultas. Em carta de 8 de outubro deste anno elle me respondeu o seguinte: «La *Acropyga* é infatti una buona nuova especie; e per essere ben sicuro l'ho confrontata anche col materiale della Coll. Emery, che possiede tutte le specie fin qui descritte».

A respeito do sub-genero *Rhizomyrma* transcrevo a seguinte nota de Wheeler: «Specimens of *Rhizomyrma* are rare in collections. The species, as shown by their yellow color and the vestigial eyes of the workers, are evidently hypogaecic and attend root-coccids like the species of *Brachymyrmex* and *Acanthomyops*. At least these are the habits observed in one of the South American species (*Rh. goeldii*)». (Amer. Mus. Nat. Hist. vol. 33, 1914, p. 47).

Dou em seguida a descripção da nova formiga que dedico ao descobridor.

### ***Acropyga (Rhizomyrma) pickeli* n. sp.**

*Obreira*.—Comprimento 2-2,2 mm.

Cabeça (Fig. 1) mais larga do que o thorax, aproximadamente tão comprida no meio (até a margem anterior do clypeo) como larga, com os angulos posteriores arredondados e a borda occipital ligeiramente chanfrada no meio. Olhos rudimentares, com-