

postos de 4-5 facetas, collocados no primeiro quarto dos lados da cabeça. Mandibulas delgadas, obliquas, margem apical geralmente com 4 dentes mais ou menos obtusos cuja formação varia um pouco, sendo por via de regra o apical mais comprido do que os outros, os dois que ficam no meio curtos, e o basal quasi rudimentar (na fig. 1 os dois dentes apicaes apparecem um pouco abreviados pela perspectiva). Num dos exemplares examinados a margem apical das mandibulas apresenta denticulação nenhuma. Clypeo curto, convexo, borda anterior no meio recta. Area frontal distincta, ligeiramente trapezoidal, quasi triangular. Sulcos frontal e occipital distinctos. Antennas (Fig: 2) de 10-11 articulos. Escapo ligeiramente curvado, um pouco engrossado na metade distal. Nos exemplares com 10 articulos antennaes o primeiro articulo do funiculo é aproximadamente tão comprido como os dois articulos seguintes juntos; o segundo articulo é mais comprido do que largo e não é outra coisa senão o resultado da fusão dos articulos 2 e 3 das antenas de 11 articulos; em muitos casos (veja-se a fig. 2) o segundo articulo do funiculo ainda apresenta um vestigio da sutura de fusão entre os articulos 2 e 3 primitivos. Nos exemplares com 11 articulos antennaes o primeiro articulo do funiculo é tão comprido como os tres seguintes articulos juntos; segundo articulo pequeno, tão comprido como largo, terceiro articulo distinctamente transversal, articulos 4-7 um pouco mais largos do que compridos, articulos 8-9 aproximadamente tão compridos como largos, articulo terminal mais comprido do que os tres articulos anteriores. Thorax posteriormente quasi tão largo como anteriormente, no meio (visto de cima) um pouco comprimido. Pronoto muito mais largo do que comprido. Sutura pro-mesonotal profunda. Mesonoto só um pouco mais comprido do que largo, visto de perfil convexo. Metanoto muito curto, sutura meta-mesonotal muito fina, mas distincta, pelo menos em alguns exemplares. Constrição epinotal distincta. Epinoto mais largo do que comprido, face basal aproximadamente  $\frac{1}{3}$  da face declive, confundindo-se aos poucos na linha de encontro. Peciolo com uma escama bem desenvolvida, ligeiramente inclinada para deante, comprimida no sentido antero-posterior, mais larga do que a metade do epinoto, com a borda dorsal arredondada e as faces anterior e posterior achatadas. Gastro grande, elliptico, com a extremidade anal coniforme. Patas fortes, tarsos engrossados.