

grecido. Primeiro artícuo funicular engrossado, oval, artícuo terminal um pouco menos comprido que os dois antecedentes adicionados. Mandíbulas com um dente apical e 4 dentículos. Asa enfumaçada.

Instituto de Biologia Vegetal (Nr. 7.766.)

Pheidole coffeicola n. sp. (Fig. 2)

Esta espécie nova é vizinha de *Ph. laevifrons* Mayr (1887, Sta. Catharina), mas difere pela cabeça maior, escapo menos comprido, escultura da cabeça, etc.

Soldado.—Comprimento 4 mm

Cabeça (sem as mandíbulas) tão comprida como larga, anteriormente mais estreita do

que posteriormente, ângulos posteriores arredondados, bordos laterais distintamente convexos, bordo posterior distintamente côncavo. Sulco fronto-occipital distinto. Olhos convexos, situados um pouco diante do terço anterior dos lados da cabeça. Mandíbulas robustas, com um dente apical e outro subapical e diversos dentículos. Clípeo achatado, na região central ligeiramente elevado, anteriormente no meio ligeira e estreitamente excavado. Área frontal pequena, deprimida. Carenas frontais pouco salientes aproximadamente paralelas. A extremidade do escapo dista dos ângulos posteriores da cabeça por $\frac{1}{4}$ do seu comprimento; primeiro artícuo funicular quasi tão comprido como os




Fig. 2. — *Pheidole coffeicola* Borgm., n. sp., cabeça do soldado. (C. Lacerda del.)

arts. 2-3 adicionados, artícuo terminal aproximadamente tão comprido como os dois artículos antecedentes juntos.

Tubérculos humerais do pronoto pouco acentuados. Merosoto com carena transversal distinta; constrição anterior côncava, vista de perfil. Sutura epinotal distinta. Face basal do epinoto aproximadamente tão comprida como a face declive. Espinhos epinotais compridos.

Pecíolo com o nódulo moderadamente alto e não excavado, pedunculo (visto de cima) de cada lado com um dentículo, face ventral ligeiramente convexa. Postpecíolo mais largo que comprido, visto pelo dorso com ângulos distintos, lateralmente.

Gástro pequeno, achatado, oval, truncado na base.

Cabeça moderadamente brilhante (menos brilhante que em *laevifrons*), fóveas antennais com rugas concêntricas, região acima das fóveas antennais reticulado-rugosa, genas