

nos exemplares de 6 artículos funiculares, o primeiro é tão comprido como o segundo, o qual apresenta um rudimento de divisão; nos exemplares de 7 artículos funiculares, o




Fig. 8 — *Acropyga (Rhizomyrma) paramaribensis* Borgm., operario, corpo de perfil. (G. Lacerda del.)

segundo artigo é mais comprido do que o terceiro; artigo terminal mais comprido do que os quatro antecedentes adicionados (quando há 7 artigos funiculares).




Fig. 9 — *Acropyga (Rhizomyrma) paramaribensis* Borgm., cabeça do macho. (C. Lacerda del.)

Torax anteriormente um pouco mais largo do que posteriormente. Pronoto mais largo que comprido. Mesonoto visto de perfil na parte anterior distintamente côncavo, na parte posterior declive. Contrição epinotal distinta. Epinoto visto de perfil na base distintamente convexo, face declive oblíqua e réta.

Pecíolo com o pedunculo muito curto, face anterior do nódulo ligeiramente côncava, face posterior abrupta, subvertical.

Moderadamente brilhante, finamente chagrinado; o tegumento facilmente se enruga ao dessecar-se.

Pubescência amarelo-pálida, abundante na cabeça, no corpo e nos apêndices. Pilosidade eréta, curta, amarela esparsa.

Coloração amarelo-avermelhada, dentes mandibulares pardos.

Fêmea. — Comprimento 2,5 mm., asa 2,5 mm. Cabeça (sem as mandíbulas) um pouco mais larga do que comprida. Olhos côncavos. Ocelos distintos, pretos. Antenas com 8