

Surinam, Cottica R., May 14, 1927. Wie schon SANTSCHI hervorhebt, steht die Art *gravenhorsti* Westw. sehr nahe; aber bei *gravenhorsti* ist das Stielchen relativ schmäler und länger, bei lemoulti kürzer und so breit wie der Hinterleib. Die seitlichen Ocelen berühren fast den Augenrand; bei dem Exemplar von Cayenne sind sie ca. 1/3 ihrer Breite vom Augenrand entfernt, weshalb ich die Zugehörigkeit für etwas zweifelhaft halte (vielleicht eine Varietät).

Eciton (Acamatus) swainsoni Shuckard, 1840.

Material examinado do Museu de Berlim: 1 macho do Mexico, Soconusco, 9-VIII, Purpus S.V.

Segundo EMERY a especie ocorre desde o Mexico até o Paraguai. Na minha collecção se encontra 1 macho da Bahia, MENOZZI det., e 1 macho determinado por mim de Goyaz, Campinas.

Em 1932, pude examinar no Museu Britânico o exemplar tipo, rotulado "Type Brasilia Capta D. Swainson". Os ocelos são grandes, sua distancia mutua e da margem ocular é pequena. As mandíbulas são ligeiramente e uniformemente curvadas. Parece-me que EMERY (1900, Mem. Ac. Sc. Bologna, fig. 22) exagerou um pouco a curvação da parte apical das mandíbulas. — No Museu Britânico vi ainda 2 machos de Trinidad, May 1923, H. A. Ballou collector, determinados por DONISTHORPE como *swainsoni*; mas trata-se de uma forma distincta, porque os ocelos lateraes tocam a margem ocular.

Von *swainsoni* konnte ich 1932 im Londoner Museum die Type untersuchen; sie war bezettelt: "Type Brasilia Capta D. Swainson". Die Ocelen sind gross; ihr gegenseitiger Abstand und der Abstand vom Augenrand klein. Von den Mandibeln machte ich mir folgende Notiz: Mandibeln gleichmässig etwas gebogen. Es scheint mir, dass EMERY in der 1900 publizierten Figur des Kopfes (Fig. 22) die apikale Krümmung der Mandibeln etwas übertrieben hat. — Im Londoner Museum fand ich noch 2 von DONISTHORPE determinierte Exemplare von Trinidad, May 1923, H. A. Ballou collector; sie unterscheiden sich von der Type dadurch, dass die seitlichen Ocelen den Augenrand direkt berühren.

Eciton (Acamatus) hopei Shuckard, 1840.

Material examinado do Museu de Berlim: 2 machos, rotulados: Ost-Bolivien, 750 m. I-III-1907, Steinbach S.V.

O tipo é proveniente do Brasil (SWAINSON leg.). Na minha collecção se acham exemplares de Pernambuco (Tapera, PICKEL), Goyaz (Campinas, SCHWARZMAIER) e da Argentina (Santiago de Estero, WAGNER). O escutello apresenta um distinto sulco longitudinal. O peciolo, visto de perfil, apresenta na face ventral uma saillancia angulosa.

Wie schon SHUCKARD hervorhob, besitzt das Schildchen dieser Art eine deutliche Längsfurche. Die Ventraleite des Stielchens ist im Profil winklig.