

klar hervor, wenn man kleine Arbeiter vergleicht: die Fühler von *pseudops* s. str. sind distal viel deutlicher verdickt als bei *garbei*.

Eciton (Acamatus) goeldii Forel, 1901.

Material do Museu de Berlim: 1 operario menor, rotulado: Bahia, Göldi. Eciton Acamatus goeldii For. Paratypus.

Esta especie foi mencionada por mim (1933, p. 162) de Goyaz (Corumbahyba). Pude tambem examinar cotypes do Museu de Genebra. Parece que se trata de uma especie rara, muito bem caracterizada pela cabeça alongada. A forma do peciolo varia bastante conforme o tamanho dos exemplares.

Diese Art scheint selten zu sein. Sie wurde von mir (1933) aus Goyaz erwähnt (Corumbahyba, SCHWARZMAIER leg.). Sie ist gut charakterisiert durch den länglichen Kopf; das grösste Exemplar meiner Sammlung hat eine Gesamtlänge von 6 mm. Die Form des ersten Stielchengliedes variiert je nach Grösse der Exemplare.

Genero Cheliomyrmex Mayr, 1870

Cheliomyrmex morosus Smith, 1859.

Material examinado do Museu de Berlim: 2 machos, Mexico, 27-VII, Soconusco, Purpus S.V.

Esses dois exemplares correspondem mais ou menos á var. *payarum* For., cujo typo é de Honduras. O typo de *morosus* s.str. é do Mexico. Como os exemplares do Museu de Berlim são do Mexico, duvido que a variedade *payarum* seja valida. Segundo WHEELER (1921), *nortoni* Mayr (descripto sobre operarios) é synonymo de *morosus* Smith. Possuo 1 operario de *nortoni* (Vera Cruz, Mexico), recebido de WASMANN. O tegumento é brilhante, como, em *megalonyx* Wheel., de que possuo cotypes (Guyana Ingleza).

Die Varietät *payarum* For. (von Honduras beschrieben) halte ich für zweifelhaft; die Exemplare des Berliner Museums entsprechen der Beschreibung von FOREL (1899) und der Figur von EMERY (1900), stammen aber aus Mexico, woher auch die Type von *morosum* stammt.

Cheliomyrmex andicola Emery, 1894. (Figs. 1-2).

Material do Museu de Berlim: 1 soldado, Columbia, Fuhrmann, Forel ded. 1922.

O typo é de Panamarca, Perú. EMERY descreveu *andicola* como subespecie de *nortoni*, mas trata-se sem duvida de uma boa especie, distincta tanto de *morosus* como de *megalonyx*. No exemplar de Colombia, os dentes apicaes das mandibulas são mais compridos do que representa a fig. publicada por EMERY (1894, fig. 11). A descrição original é muito resumida; dou alguns caracteres do exemplar de Colombia:

Soldado. — Comprimento total 6 mm. Cör de chocolate, cabeça ligeiramente mais escura: patas e antennae amarello-ferruginosas.