



Fig. 1. *Cheliomyrmex andicola* Em., soldado, cabeça, vista dorsal. — Fig. 2. *Idem*, thorax e peciolo, vistos de perfil. (Borgmeier del.)

O tegumento é finamente chagrinado-reticulado, mate; o gaster é mais finamente reticulado, ligeiramente brilhante. Em toda a parte com puncturas esparsas piligeras. Cabeça muito convexa na face dorsal, mais larga que comprida no meio (sem as mandíbulas), porporção 64 : 55; posteriormente mais estreita que anteriormente, angulos posteriores arredondados; bordo posterior recto. Olhos rudimentares, situados um pouco em baixo do meio dos lados da cabeça. Escapo ultrapassando um pouco o nível dos olhos; primeiro articulo do flagello mais comprido que o segundo (15 : 12); todos os articulos antennae mais compridos que largos; articulo apical tão comprido como os dois precedentes addicionados. Ao lado das foveas antennae ha uma curta carena longitudinal. Sutura mesoepinotal representada por um largo sulco transversal. Mandíbulas e perfil do thorax como na figura. Peciolo transversal, em cima convexo. Primeiro segmento do gaster separado do segmento seguinte por um sulco distinto, mais largo a traz do que comprido no meio (22 : 18).

Von dieser Art konnte ich leider keine Typen untersuchen; die Typen stammen aus Peru, Panamarca. Das Ex. des Berliner Museums (aus Columbia) wurde von FOREL determiniert. Der Apikalzahn der Mandibeln ist bei diesem Exemplar beträchtlich länger als er in Fig. 11 von EMERY (1849) dargestellt wurde. Da die Originalbeschreibung sehr kurz gehalten ist, gebe ich einige Merkmale des Exemplares von Columbia: Länge 6 mm. Färbung schokoladenbraun, Kopf etwas dunkler, Beine und Fühler rostgelb. Fein dicht genetzt-chagriniert, matt; Gaster feiner genetzt, deshalb schwach glänzend; überall mit deutlichen zerstreuten haartragenden Punkten, Kopf dorsal stark konvex, breiter als in der Mitte (ohne Mandibeln) lang (64 : 55), hinten schmäler als vorn, Hinterecken abgerundet. Augen rudimentär, etwas unter der Mitte der Kopfseiten gelegen. Schaft etwas über das Niveau der Augen hinaufragend; das erste Geisselglied verhält sich zum zweiten wie 15 : 12; alle Geisselglieder länger als breit; Endglied so lang wie die beiden vorhergehenden zusammen. Seitlich von